




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2550/A

2550/A

A xviii o i





Georgij multo.

86664

CLAVDII

W. Lam bard.

GALENI PER-
2588

GAMENI DE AR-

te curatiua ad Glauconem,

Libri duo.

Nicolao Leonicensio Vincen-
tino interprete.

*Quibus accesserunt accuratissime ani-
maduersiones ex veneto exem-
plari excerptae.*

REM MAXIMAM SIBI




PROMITTIT PRUDENTIA.

LVGDVNI,

Apud Gulielmum Ronillium,

Sub scuto Veneto.

1549.





GALENI DE

ARTE CVRATIVA

AD GLAVCONEM

LIBER I.

NICOLAO LEONI-

ceno interprete.

CAP. I.



Vod quidē nō cōmunem tantū omniū hominū naturā medicū cognoscere oporteat, ô Glauco, sed & vniuscuiusq; propriā, & dudū ab Hippoc. rectē traditū est, & nos in ipsis artis operibus (vt nosti) circa id sufficienter studuimus. Non tamen propriā singulorū naturā æquē atq; cōmunē possibile est scribere. Verū scripta cōtrario modo se operibus habent, tum in plurib⁹ aliis rebus, tū præsertim in his quæ ad præsentē pertinent intētionem. Petiisti enim à nobis, vt tibi vniuersalē quādam mēdēdi viā ac rationē, quas per figurā ostēderemus: hæc aut & qualitate & quātitate singulorū medicaminū perficitur: necnō & modo eorū vsus, & ex tēporis occasiōe quæ

A 2

præ omnibus est cognitu difficillima: circa
quam præcipitem admodum existentem
(quemadmodum quodam in loco scribit
omnium bonorum nobis autor Hippocr.)
vides plerunque medicos non modò vul-
gares, sed & præcellentes aberrare. Quod
verò magni etiam momenti sit, si quãtitas
opportunè pro viribus accommodetur, idẽ
vir pariter scripsit. Quum igitur ad rectè
medendum plurimum conferre, & tempo-
ris occasio, & auxiliorum quantitas videat-

† ἀπὸ τοῦ tur, *†* insint autẽ hæc unicuique ægrotanti
ι. inuenies. propria, nihil autẽ proprium possit sermo-
ne explicari, hoc pacto quod commune est
** in Græ.* * conamur transigere, quãuis id sit vsu fe-
ἀναγκα- cundum. Nam & quosdã aliquando ægro-
σόμεθα tos visimus, cum quibus dum sani essent nõ
γράφειν. eramus versati. Quo fit vt neq; quẽ colorẽ
ι. scribere quam habitudinẽ, aut nativũ calorem, aut
cogimur. quem arteriarũ pulsum à natura habuerint
agnoscamus: quæ si sciremus, magnitudinẽ
morbis satis aliquando iudicare possemus.
Nam quantum vnumquodque à naturali
statu recedit, ad tantam morbus magnitu-
dinem peruenit: quantumcunque verò rece-
dit: possibile est scire ei qui naturalem sta-
tum exquisitè cognouerit. Quũ igitur hoc
in ipsis nobis fuerit ignotũ, ne omnino hæ
[hæc non] sitemus ad cõmune confugimus. [quamuis
ad

ad vsum secundum locum obtineat]. Hic *habentur*
 verò artifex plus aliquid quàm hi qui arte *in græco*
 carent assequitur. Quod verò hoc ipsum *exemplari.*
 plus sit, primus omnium quos nouimus, &
 hoc memorauit Hipp. Plenius autē de hoc
 scripserunt qui Hippocr. fuere posteri ores
 atque illius scripta accuratè legerunt. Ex
 quorū numero vnus fuit Mnesitheus Athe
 niensis, vir tum in aliis omnibus quæ ad
 artem pertinent sufficiēter doctus, tū verò
 qua via ac ratione, medendi scientiam opor
 teat exercere nemini peritia secundus. Hic
 igitur Mnesitheus à primis atque supremis
 incipiēs generibus; putauit secari illa opor
 tere in alia genera speciesq; ac differentias:
 hæc rursus in alia diuidi, ac denuo ista eodē
 modo, donec ad talē peruenerimus speciē
 post cuius diuisionem ad vnum numero &
 indiuiduum peruenimus. Mihi verò qui ad
 te scribam, sufficit breuibus meā explicasse
 sententiam. Nam ridiculus videri possem,
 si tua te velim docere, tanquam non multo
 antea à Platone illa didiceris. Neque enim
 vt te docerem quam viam ac rationem in
 in diuisionibus sectari oporteat, hæc volui
 meminisse. Sed quoniam mihi ad sequētia
 omnia plurimum conducere existimaui, &
 quū à me exigeres ediscere causam ob quā
 medicorum plurimis oberrare contingit,

non aliter tibi ostendere poteram. Etenim quæ in aliis institutionibus cōtingūt errata, & quæ medici nūc in ægrotātū curatio-
ne delinquūt, hāc primā atq; præcipuā cau-
sam habent, diuisionis scilicet prauitatem.
Quidā autē in primis & supremis generi-
bus stant: indicationibus solū quæ ab illis
sumuntur, cōtenti quidā verò vsq; ad ali-
quid diuidūt, non tamē vsq; ad finē perue-
niunt: nonnulli verò etiā vitiosis vtuntur
diuisionibus. Qui verò & omnia quæ sunt
secundū naturā & præter naturā hoc diui-
sionis artificio cōplectitur, atq; ab his om-
nibus quæ sufficiēter diuisa sunt, sumit in-
dicationes: hic solus quantū humanis per-
mittitur viribus medēdo non errabit. Illos
quidē quorū habet notitiā, melius curabit
quā alios, ignotos verò proximē illis quo-
ad fieri poterit ad sanitatē perducet. Siquis
enim primūm distinxerit eam quæ secundū
ætates differentiā postea eam quæ secundū
temperaturas atq; potētias, & ceterā quæ
hominibus insunt, colores dico, atq; calo-
res, habitudinesque, & pulsuū motus, & af-
fuetudines, ac industrias, atq; animi mores,
his quoque adiunxerit eam quæ maris à fœ-
mina differentiam, & quæcūque ad regio-
nes & temporum pertinent status, aliasque
eius qui nobis circumfunditur aëris varie-
tates

† In ant.

ædificat

tates recto modo cōsiderauerit hic ad pro- *id est tem-*
 priam laborātis naturam agnoscendā pro- *peries.*
 ximè accedet. Sed ex his omnibus nōnulla
 quidem in libris de pulsibus, nōnulla verò
 in his in quibus agitur de tēperaturis sunt
 determinata: sicuti quæ præter naturā sunt,
 vniuersa quomodo inter se & speciebus &
 generibus differāt, in libro de passionibus
 est præfinitū. Nunc verò de his solū ægro-
 tis dicere proposuimus, quorum natura, an-
 tequā morbum contraherent, nobis erat
 exquisitè perspecta. Cum quibus tamen &
 reliqui omnes intelligentur qui nobis erāt
 ignoti. Nihil enim difficile, ab eo quod est
 perfectè distinctū, id quod nō sit tale inue-
 nire. *De febribus ephemeris.* CAP. II.

Initū igitur sumemus à febribus, quo-
 niam tu in his præcipuè curandi artifi-
 cium habere cupiebas. Et primū quidem
 de his sermonem habeamus quæ simplicis-
 simæ sunt, quas Hippocrates ephemeris ** In ant.*
 appellat. Hæ verò sunt quæ propter lassitudinem *legitur*
 eneniunt, & ebrietates, atque iras, *in report.*
 furores, atque mœrores, atque aliās animi *pag. i. ve-*
 curas ** assiduas,* & quæ ex inguinum inflā- *hementio-*
 tionibus febres ortū habent, ex hoc ge- *res: in im-*
 nere sunt, præterquā si absq; vlcere fiāt ma- *pres. auu-*
 nifestò: tūc enim suspicionē afferūt, & nullo *τόνός. i. ve-*
 modò mites sunt. Vigiliæ plerūq; simplicē *hementes.*

*In ant. co
dice addi-
tur τὸ το
i. hoc pa-
cto.*

febrem induxerunt, sicuti frigefactio & exustio quandoque. Atque hæ omnes febres* soluuntur facillimè. Oportet siquidē eos confestim ducere ad balnea, atque ad aliam consuetam victus rationem. Quandoquidem qui pertritum illum sermonem medicorum triduanum terminū expectant sæpius acriores febres effecerunt, quamuis & aliter præter ea delinquant, quemadmodum cernis ex eis plures, in primo ingressu delinquētes, veluti re vera manufactas facere ægri tudines. Sed cura quidem harum febrium in promptu est: at earum cognitio maiorem exigit diligentiam: de qua nemo antè nos quantum oportuerit scriptum reliquit. Quare minus mirandum complures tantum in medicinæ operibus aberrare, quantum etiam cognitione falluntur. Sæpius enim quidā casu aliquo in graues morbos incidūt, veluti vino pleni, aut sole exusti, aut frigore enecti, aut lassitudine oppressi, aut vigilias passi, aut ira perciti, aut quauis alia causa, quæ per se nocere natura fit apta, correpti: deinde totum in causa antecedente consistere, neque aliā subesse dispositionē arbitrati, circa victum negligētius se habent, adeo vt se ipsos lateant in insanabiles aut ægrè curationē admittentes morbos prolabi. Hæc igitur præcipuè sunt animaduer

animaduertenda, quemadmodū Hipp. admonet: non solum futura præcognoscere, sed præterita etiam atq; præsentia. Nam & quod nūc pponitur, ad eā artis attinet partē: quod pro viribus manifestè trademus. Neque enim parua est differentia, si laueris iam ægrotantem & securū esse iusseris, aut eum per omnē custodiam securitatem quæ traduxeris. Quum igitur ad ægrum accedes, primū à maximis quæ circa ipsum sunt consideratio incipienda, deinde & ab aliis, adeo vt nec minimum aliquod omittamus. Nam vt magis aut minus ei quæ fit ex maximis indicatione credamus, ex aliorum fit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febricitatibus signa, in pulsibus atque urinis consistunt: his verò addere oportet & quæcunque alia circa faciem Hippo. scribit accubitus quoque & respirationē, item ea quæ ab ore excernuntur, atque alui sedimina. Et si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operationē consistere videas (qualia ille mille in millibus scripsit) neque ex his vllum aliquod negligenter prætereas: hæc quidem omnibus febribus communia sunt. Itaque in his simplicissimis, de quibus præsens est sermo, nihil horum relinquere oportet. At postquam ex *In cod.* pulsibus atque urinis febris naturam per- *Ald. habe.*

tur hōs ceperis, quum pulsus nullum inflammatio-
i. morē in nis signum habuerit, neq; omnino in aqua-
veteri au litas in vna arteria cōpulsione apparue-
tem ei dōs rit, aut si hoc affuerit, omnino sit imbecille,
i. formā. vrinae aut omnino similes his quae secundū
 naturam se habent, aut non multum à natu-
 rali statu recesserunt: tunc & ad omnia illa
 quae antea à nobis sunt dicta accedere oportet.
 Et quum veluti chorus quidam omnia
 concinnè loquūtur, tunc etiam fidere oportet,
 ac, si libeat, interrogare nunquid aliqua
 manifesta antecesserit causa. Si quid enim
 huiusmodi aeger fateatur, expectata prima
 febris solutione, statim oportet lauare,
 quum tunc certior tibi sit facta cognitio,
 ex ipso solutionis modò. Nam arteriarum
 motus in hoc in totum assimilatur huic
 qui in sanis deprehenditur, quum in nulla
 alia febre ad naturalem habitum reuertatur,
 neque si multum temporis inter primae
 accessionis finem, & secundae principiū in-
 tercidat, quemadmodum in tertianis atque
 quartanis. In illis enim, febris remanet si-
 gnum in ephemeris autem in totum aboletur
 accessione cessante: plurimis verò earum,
 & humidi quidā vapores, & quibusdā
 etiam sudores vtilis apparent: aut omnino
 quaedā ceu vaporis copia ex intimo corpo-
 ris exit. Verū vrinae quoq; multò nūc me-
 liores

liores, quā circa febris principia tibi videbuntur. Et si capitis aut alterius partis dolor simul inuaserit, neq; hic amplius persistet. Aegrotantis quoq; in tolerando facilitas: magnū & ipsa signum, tanquā sigillum quoddā super omnia alia signa, febris suauitatē tibi indicabit. Et si dū lauantur neq; horror aliquis insolitus molestauerit, neque alia tristitia affuerit. & si post balneum deinceps bene se habere perseueret, tunc ne verearis cibum offerre, vinū quoq; sine formidine ad potandum exhibe, adhibito tamen pro tempore modo nos autem, vt te nō latet, eis causam quæ antecesserit solemus prædicere, neque expectamus vt illam ægrotus anticipet enarrare, quod maximum est argumentum, illum non errare qui talē sit adeptus facultatem. Si verò remanentibus adhuc animi affectibus cōsideratio habeatur, tūc ex pulsibus maximē tendenda cognitio, quēadmodum in libris de pulsibus scripsimus. Post hos verò, & ab aliis cognitio petēda est. Quod si illa iam quidē cessauerint, remanet autē dispositio, parū quidē ex pulsib⁹ habebis indicatiū earū quæ febrē attulerūt passionū, sufficient aut tibi & sine pulsib⁹ reliqua. Cōmuniter quidē, omnibus vrinæ rufæ. Adiūgitur verò his qui propter tristitiā febricitāt, acritudo

do potius quā abundātia caloris. quēadmo-
 dum ē diuerso, his qui propter furorē. Sed
 † In græ. & extenuatio corporis † in his quos tristi-
 ita legit tia & cura vexarunt cōspectior existit: ocu-
 επιδιδωσι lorū præterea cavitās, ac quædā inconsue-
 ρα τοῖς λυ ta decoloratio. Hæc quidem sunt & his qui
 πιθεῖσιν ἢ quouis modò aliter cogitarunt, cōmunia.
 φροντισα- maximè autē ex oculis distinguere oportet.
 et, id est Nā ex his etiam in sanis, animæ mores
 conspe- possumus coniectare. At in ægrotis si quis
 etior exi- diligenter inspicere queat: sunt indicia cer-
 stit in his tiora. Sic quidem eos, qui propter discipli-
 quos tri- nas aut contemplationem aliquam diu co-
 stitia quā gitarunt: ab his quos tristitia corripuit, di-
 in his quos scernere oportet. At qui vigilarint, distin-
 cura vexa guere oportet ex forma palloris. Nam in
 uit. ipsis facies subtumens, & oculorū † motus
 † Alij le- manifestus, vix enim palpebras attollunt.
 gunt mo- Inest etiam palpebris humiditas. Nam qui
 tus ligati tristantur aut cogitationibus detinentur,
 * Græ. his exiccantur. Cavitās est cōmune accidēs
 codi. ha- omnibus, mœrori, vigiliis, cogitationibus,
 bent τοῦ non tamen furori. * in hoc enim neq; oculo
 τῶν .i. in rum cavitās neq; pallor manifestus: & plus
 his. sed caloris atque celerius ex imò prorumpit,
 hæc est me neq; pulsuum magnitudo destruitur, quē-
 lior lectio admodum in vigiliis, tristitia & cogitatio-
 nibus. Quare hæc à furore apertissimè di-
 stinguuntur. ab inuicem verò quemadmo-
 dum

dum diximus antea. Eorum etiam qui ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est sicciore quam in alia aliqua ephemera febre. Sed hoc quidem omnibus ex lassitudine febricitantibus commune existit in tempore accessione donec consistit. post hoc verò, pluribus, modò non sint supra modum labore vexati, quædam humiditates aut calidus vapor ex intimo corpore effertur. quibusdam verò etiam post febris cōsistentiā, siccitas perseverat. quod maximè accidit his quos superfluus labor oppressit, aut frigus, aut simul cū labore sunt à sole deusti.

Et quidem pulsus non eodem in vtrisque * *διεμμε-*
modo se habet. quia parvi quidem his sunt *7 Q. i. cu-*
quos superfluus labor vexavit, in aliis verò *te.*
magni. Quæ verò * corpore condensato * *malè in*
accidunt febres (condensatur autem aut *impres.*
ex frigore aut ex qualitate aliqua quæ vim *legitur*
astringendi habet, * præter consuetudi- *ἀσπόμε-*
nem ei adveniente. velut illi qui aqua *pro ἀλ-*
aluminosa se lauerat accidit) hæc quidem *θους.*
ex omnibus febribus solæ, sunt astricta *† ἀσχυρὰ*
passio. has verò tactu cognoscere licet, *ἀσ. id est*
quemadmodum & † arentes febres, & quæ *squalida.*
ex laboribus & combustionibus fiunt. Nam * *in gre.*
neque harum densitas hos queat latere qui *est ἐν ἀνὰ*
tactum habent exercitatum, sed & caloris *διὰ τοιαύτα.*
motus nescio quo pacto * regreditur. qui *increscēs.*
mitis

mitis quidem in primo tactu sentitur, acris
autem, si plusculum tardemus. Non tamen
* *ἔνδρι δ* & his urinae sunt ruffae, * neque corporis tu
τὸ σῶμα mor relabitur. neque etiam oculi caui atq;
τὸς ὄγκοι aridi fiunt, sed sunt quibus humecti magis
συνπι- atque prominentes apparent, quam hi qui
πτακεν secundum naturam se habent. Neque sunt
id est neq; pulsus minores, quemadmodum in nicero-
corporis ribus, curis, aut vigiliis aut immodicis exer-
moles con citiis.
cidit.

De febribus quae fiunt ex inflammationi
bus inguinum. CAP. III.

Febres quae ex inflammatione ingui-
num fiunt, pulsus habent maximos,
veloces, atque frequentes, plurimusque
illis calor inest, ac postquam febris con-
stitit, statim ex profundo quaedam emer-
git humiditas, calida quidem, sed mitis.
Acris etenim & mordax, huic generi fe-
brium inter omnia alia minimè adest. Atq;
in totum, facies rubicunda illis & magis tu-
† *In anti.* mens, urinae quae † subalbidae. Communis
λευκότε- autem omnibus huiusmodi febribus, est
ρα. i. al- pulsus æqualitas. Nam paucae admodum
brores. ex his febribus eã quae in vno ictu inæqua-
litate ostendunt: at neq; ipsae satis aper-
te ac manifestè illam præ se ferunt. Talia
quidem sunt ipsarum indicia. Curare autē
oportet omnes quidem balneis. At qui ex
denſi

densitate cutis, aut inguinum inflammatione febricitant, si in aëre balnei immorari iusseris, haudquaquam nocebis reliquos omnes, quam citissimè oportet ab aëre removere, si verò diutius in aqua immorari voluerint, permittere. oleo autem tepido, & multò, & manibus mollibus perfricare quamplurimum, atque hos præsertim qui ex labore febricitant, secundo autem loco qui meatus habent astrictos, & tertio qui inflammationem inguinum patiuntur, sæpius autē istos lavare in quantum possibile est. Cibum autem assumere qui ex labore febricitant possunt multoties, non æquè tamen qui ex densitate cutis, aut inguinis inflammatione laborant. At his vtrisque tenuis victus est utilis. Qui verò ex laboribus februerint, præcipuum est ut cibos assumant concoqui faciles ac cruditate præcipue deuitent, sed & vinum potare quantum possunt convincere, sunt permittendi. Mensuræ autē ratio, quæadmodum in aliis omnibus, ex viribus & ætate sumitur ægrotantis, necnon & ex naturalitè temperatura, & præterea ex cõsuetudine, & anni tẽpore, & regiõne atque aliis huiuscemodi. Qui verò ex inguinum inflammatione febricitant, arcendi sunt à vini potu donec inflammatione solvantur. At qui cutis formina habent astricta,

aut

aut refrigerati sunt, si quidem nō multum
 hoc affectū laborent, neq; plenum corpus
 habeant, nō sunt à vini potu prohibendi. at
 qui supra modum refrigerati sunt aut ple-
 niore corpore, prohibere utile est. Qui ve-
 rò ex vigiliis aut aliquo animæ affectu fe-
 bricitāt: postquā balneaueris, cibo humido
 ac boni succi reficere expedit. vinum verò
 omnibus his qui vigiliam passi sunt in tre-
 pidè offerre, nisi capitis dolore premantur,
 aut pulsū venarum in tēporibus sentiant.
 Liquet autem quod etiā in aliis eadem est
 obseruatio adhibenda. Sed & iis qui ira aut
 mœrore aliquo, † aut cogitatione febricitant,
 vinum est exhibendum, & qui * furore perciti fuerunt,
 quando omnino ab affectu quieuerunt, prius verò periculosum
 vti vino. Tentare autem oportet & cōtra-
 rium semper afferre ei quod molestat, labo-
 ri quidem quietem. vigiliis verò somnum.
 iræ autem & furoriatque tristitiæ, sermo-
 nibus, actionibus, spectaculis, enarrationi-
 bus animi iocunditatem. Sic qui cogitatio-
 ne laborat, omnino ratiocinationes omit-
 tat. Et qui ex inguinū inflammatione febricitat,
 eius curationi intēdat, ac multò prius
 vlceris, vnde originem habuit. Hæc qui-
 dem febrium ephemerarum indicia, atque
 remedia sufficiunt. Reliquæ verò febres
 nonnuq

† Additur
 in anti. ἢ
 ἀγρυπνῶ-
 σαι. i.
 aut vigi-
 lia.
 * τοῖς θυ-
 μασι.

nonnullæ ex inflammationibus, nonnullæ ex humoribus acceduntur. Et quæ ex inflammationibus fiunt, sunt veluti quædam accidentia partium † laborantium, & morbus † φλεγμαίνων-
magna ex parte ab instrumento patiente τωρ. id est
denominatur phrenitis, aut peripneumonia phlegmo-
atque pleuritis, aut aliquid tale. Sed de his ne laborā-
postea dicemus. tium.

De febris putridis. CAP. IIII.

AT quæ ex humorū putredine febres accenduntur (ab hoc ipso nominantur febres) & sunt non accidentia morborū sed ipsæ morbi. Ex his vero nonnullæ quidem sunt sine accidentibus, quæ & mitissimæ sunt, quædam verò cum accidentibus infestant. Nos verò de prioribus dicamus febribus quæ accidentibus carent. In quibus maxime, si fieri possit, primo die qualis sit febris, acutane an diuturna, est cognoscendū, & vtrum ex his quæ intermittentes dicuntur, an continua. Quod si primo statim die certa cognitio haberi non potest, secundo saltem febris forma inuenire tentandū est. Quod si neq; in hoc aliquid firmum aut stabile sciatur, in tertio saltem aliquid manifestius apparebit. Nam paucae admodū sunt, quæ, vt exquisitè dignoscantur, quartū desiderent. Ego verò quam breuissimè poterō, indicia explicare tētabo, ex quibus spe-

B

ciem febris intelliges. quanuis de istis planius ac manifestius alibi disseruimus.

De signis febrium intermittentium. CAP. V.

QUæ igitur cum rigore inuadunt, nõ ab re ex earum numero esse iudicabis: quæ per circuitum infestant. Tertianæ enim atque quartanæ in totum cum rigore faciunt accessiones. Sed tertianæ quidem in primò insultu cum nimio sæpe rigore incipiunt. quartanam autem non vidimus cum vehementi rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo illi superuenit, præter id quod neq; statim ab initio hæc febris vt plurimum solet inuadere: sed aliis quæ antecesserint subsequi. Quartana itaq; eas quæ errabundæ aut [chronicæ] dicuntur † propter phlegma insequitur. Quotidiana verò intermittens rarò aduenit sine oris ventriculi læsione. quemadmodum quartana ex malè affecto splene generatur, & tertiana ex iecoris affectu. Quæ verò cū valido rigore incipit, magis febris tertiana quam aliqua aliarum febrium fore speratur. Si verò & alia quæ postea dicentur signa attestentur, hæc proculdubio in prima die tertianam esse cognosces. Quòd si cū paruo rigore inceperit, tunc magis alia signa attendere mente oportet. quoniam nõ
quo

[non est
in græ.
† Διά
φλεγμα
non est in
anti.

quotidiana intermittens tātum atq; quartana. sed etiam hemitritæus aut aliqua alia ex continuis esse potest. Alia verò signa & ex caloris qualitate & quantitate & arteriarum motu sumūtur. ex ipsa etiā rigoris, qui sentitur forma, anni tempore, & regione, & temporis statu, atque ex natura, & ætate ægrotantis, & iis quæ præcesserunt, & quæ sequuntur. Nam calor quidem multus & acris esse debet: pulsus autem magni, calidi, vehementes, veloces atque frequentes, omnis inæqualitatis præter quam febrilis expertes. Rigor autem, veluti si à re aliqua acuta plus, quam frigida corpus pungere-
tur. quum hi qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem sentiant. Tempus autem anni æstivum. sicuti & locus & præsens status calidus. Sit autem & ægrotantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis, & exercitationes potius, quā ociositas antecesserint, magis deustio quā frige factio, & parcitas cibi potius, quā crapulæ. Vigiliæ quoque, mærores, atque labores, & intēsa cogitationes ad eundē perducunt effectū. Quòd si multos alios eodē tēpore laborantes cōtingerit tertianis corripī febribus, hoc quoq; maximū aliqd præter ea quæ nuper diximus signū erit. Quòd

καὶ ἐπὶ τοῦ ποτὰ τὰν i. e. λόγῳ
 si hæc omnia affuerint indicia, aut saltē quæ
 maxima sunt, & aut plurimū occasionis ha-
 bēt, sitis quoq; vehemēs adiungatur, vom-
 itusq; bilis, aut sudor, vel vtraq; supervene-
 rint, tūc nulla dubitatio relinquitur. Quòd
 si inter hæc à febre quieverit homo, hac
 inquā quæ ex suo motu est omnibus nota,
 propria verò febriū inæqualitas in arteria-
 rum motu relinquatur, tunc firmiter pote-
 ris, esse tertiana febrem ostendere, ac si ter-
 tio iam die accessionem fecisse vidisses.

De signis Quartanæ. CAP. VI.

Quartana autem (nam & huius signa
 scribere oportet) manifestissimum
 sui præbet indicium in principiis accessionū,
 quādo rigēt adhuc qui quartana laborant.
 Nā eorū pulsus satis tardi sunt ac rari. Quū
 autem consistit febris, atq; etiam augetur,
 necesse quidem est vt. veloces fiant atq; fre-
 quētes, Servatur tamē & tūc propria ipsius
 tarditas ac raritas, si additā velocitatē atq;
 frequentiam in accessionibus mediteris. Et
 quidē si cōparaueris quartanæ febris confi-
 stentiā tertianæ cōsistentiā, nō parū velo-
 cius atq; frequentius in tertianis pulsus ar-
 teriarū moveri videbūtur. Et ipsius vnus
 motus inæqualitas in quartana febre for-
 mæ eius monstrat. Nā quæ omnibus cōmu-
 nis est febribus in vno pulsu inæqualitatē,
 in

in hac manifestissimè licet cōprehendere. Multo enim velocius principiū, finemq; motus inuenies quā medium. nō tamē in tertia ita se habet brevis etenim in ipsa est velocitatis excessus atq; in cōsistentia præsertim. Verū & caliditatis indicia diuerso modo se habent. Nā æstus & deustionem, & quendā velut feruorē, qualiter in tertianis videtur, in quartanis haud quaquā inuenies. Hæc igitur signa maxima sunt, reliqua verò externa. nā neq; hæc sunt omittēda. Sed & ægrotantis, natura est inspiciēda, si in ea atra bilis abundat, & tēpus quoque anni, si autūnus: & præsens status, si inæqualis. Sic verò & loci natura, & morborū peruagationum populariter & si lien intumuerit, febrisq; sine ordine antecesserit, & ætas senior quā consistentium, & si cū sudore febres desināt. In his vero bilis flaue vomitus minimè est expectandus, quemadmodū nec in quotidianis intermittentibus. hoc etenim tertianarum proprium est signum. At quum febris cessauerit, si adhuc signū febris remanserit, pulsusq;, his qui secundū naturā rariores ac tardiores fuerint, quarta proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidiana intermittentis. CAP. VII.

Febrem verò quotidianā intermittentē vel ex his maximè signis agnosces.

B 3

Nam eius caliditatem humidiorē cū quadā acritudine esse oportet: nō quum primum manus admouetur cōfestim occurrentem, sed per morā. Nā quædam fumosa caliditas cum multo vapore commixta exire videbitur, quā magis ignis in humore suffocetur quā ipsum possit cōvincere. Sed & his lōgè minores sunt pulsus pulsibus quartanarū, quā istarū pulsus pulsibus tertianarum. Rursus verò tanto rariiores sunt in quotidianis intermittētibus pulsus, his qui in tertianis, quāto illis pulsus quartanarū: at tarditas in vtrisq; eodē modo se habet. Minus verò siticulosa hæc febris est: tantūq; eā quartana excedit, quātū istā tertiana. lingua verò & totū corpus siccissimū est in tertianis. at in febribus his humidissimum & vomitus pituitosi. & quæcūq; per ventrem excernuntur frigidiora sunt atq; humidiora & crudiora, aquosiora & pituitosiora. Vniuersum corpus deniq; in hisce febribus plenum crudis humoribus inuenitur. Et quidē ætatibus, naturis, anniq; statibus, & tēperaturis humidioribus accidunt. Nam adolescentē biliosa ac sicca tēperatura, nunquā vidi huiusmodi corripī febre. Pueri autem, & præsertim minores natu, & ex his qui iam perfectū corpus habēt, pituitosi & habitus crassi, atq; ocio plurimò de-

diti,

di, crapulis, ebrietatibus, balneis assiduīs, post cibum præsertim, vtentes, à quotidianis facillè capiuntur. Loca etiam humidiora atque ex anni temporibus hibernum, atque ex statibus humidiores, hanc præcipuè afferunt febrem. quod si sit etiam populo communicata, tunc præter ea quæ antea diximus signa, hoc quoque non parum ad eā diagnoscendam conducit. Non tamen harum febrium declinationes, quemadmodū tertianarum & quartanarum, sudoribus terminantur. Quare neq; ad integram quietem (exceptis paucis) perueniunt. Urinæ verò quæ procedentibus ipsis adueniunt, totius morbi tempora docent: quæ autem in principiis videtur, febris etiam speciem indicabunt. Nam in quotidianis vel albæ sunt & tenues, vel crassæ & turbulentæ, vel rubicundæ, tertianis autem ruffæ vel subrufæ: quartanis verò variæ quidem, sed crudæ omnes: & hæc quidem sunt febrium intermittentium signa.

De signis febrium continuarum.

Cap. VIII.

Febres autē cōtinuas ex eo cognosces, quod nullū eis adest ex signis quæ intermittentibus adesse diximus, & si intra etiā quatuor & viginti horas nō cessauerit febris. Si verò inæquale habuerit incrementū

B 4

hæc quidem præter alia signa longius etiã
 tempus ostendit, & quidem si & proprium
 febrium signum in pulsibus manifestũ ha-
 buerit. Si verò inordinatio quædam ac in-
 æqualitas ipsis vel inconcinnitas adsit, &
 hoc etiam indicium simul magnitudinis ac
 continuitatis. Si verò in hoc statu permanẽ-
 tes tertio die maiorem accessionem osten-
 derint, aut excrementa & vrinæ omnino crũ-
 dæ apparuerint, non possunt huiusmodi
 febres ante septimum diem terminari. Si ve-
 rò & quarta dies tertiæ diei similis fuerit,
 & febris veluti deurens, neq; facies aut reli-
 quum corpus collabitur quicquam, huiusce-
 modi febris ad longius tempus extendi cõ-
 suevit. Tales quidem sunt differentię earũ
 febrium quæ accidentibus carent. Curatio
 autem cuiusque earum deinceps scribetur.
 Primum quidem intermittentium. deinde
 vocatarum continuarum. Ex intermittenti-
 bus verò breuissima ac mitissima est ter-
 tiana. lōgissima autē, ac, quantũ in ipsa est,
 haudquaquam periculosa, quartana. quoti-
 diana autē, lōga & non sine periculo. Qua-
 re ab initio statim ad vniuersum ægritudi-
 nis tempus inspicientes, rationem victus
 instituemus. Nam quæ velociter fiunt, ac ce-
 leriter ad statum veniunt, & si valde tenuẽ
 victũ exhibueris, non multum lædes. Quæ
 verò

verò sunt diuturniores nisi ab initio grandiori cibo reficias, hominē cum morbo pariter perimes, aut intēpestiuē victus modū commutabis. Neq; enim oportet statu accedente, grandiorē quā prius cibū offerre, sed contrā potius, tenuissimum victum qui in toto modo exhibeatur, in statum reservare: Hoc igitur in omnibus cōmune præceptum. Sed oportet præterea quæ singulis febribus intermittentibus propria sunt considerare. Veluti cōfestim in tertianis (neq; enim malè ab his initium sumēdum) primū distinguā si exquisita sit febris, & (vt quispiam diceret) legitima, aut nō exquisita sed velut nota quædam. nam quæ exquisita est tertiana, ad maximum septem circuitibus iudicatur. præter id quidem, etiam minimè periculosa. alteram verò, quæ non est exquisita, vidi quandoq; quum in autumno incepisset, in vere desisse. tum verò vt par est in tempore adeo longo, tum quia ægrotus medici præceptis nō perinde paruisset, sed in quibusdam deliquisset, tum quia ex hyeme læsus esset, lien maximè intumuit, & præcordia flatibus fuerunt oppleta: & iam subtumida quædam erat decoloratio in facie, ac præsertim circa crura, adeo vt nobis de adolescente dubitare contingerit, ac maioribus vti remediis fuerit necessarium. Sic

B 1

igitur nihil simile habet huiusmodi tertiana cum exquisita. Quare & ab initio eas distinguere oportet. Quantum enim natura differunt, tantum rationabile est rationem victus permutare. Vt igitur eas optimè sciamus distinguere, quæ adolenscenti acciderint mihi sat erit scribere, quæ veluti quædam exempla ac monumēta tibi futura sunt earum quæ non exquisitæ sunt tertianæ. Erat tempus anni medium inter occasum pleiadum & quod antecesserat æquinoctium. Inceperat autem febris cum horrore adolenscenti circa auroram ferè, quæ neq; in caliditate similis tertianæ videbatur, neq; in pulsibus, sed neq; vomitus bilis subsequutus est, neq; sudor sufficiens. Sed in die secundo tantummodo circa horam tertiam, pauci humidi vapores exierunt, ex quibus febris quidem exhalavit, ita pedetentim vt vix circa vespere expers febris videretur. Nam febris signum satis manifestum in pulsibus in ipso manserat. In reliquis verò circa vespere satis bene se habebat, & per totam noctem. Rursus verò circa tertiæ diei auroram, secunda accessio facta est, omnino præterquam in tempore, similis. Nam nocte superueniente, paululum ante diem vapores aduenerunt, ac circa quartæ diei auroram febris cessauit. Ac reliquo autumnii tempore, atq; hyemis

mis quo ægrotavit cum alia omnia, tum &
 tempus accessions & solutionis febris eo-
 dem modo perseverarunt. Agebat autem
 adolescens circiter decimum octauum æta-
 tis annum. albus aspectu & pinguis. qui sæ-
 pius antea in ocio degerat, & crapulis bal-
 neisq; plurimis & repletionibus vsus erat:
 Quare neque bene cibos concoquebat. Si-
 mul autem ei aduenit durities in pulsu. In
 prima autem die atque secunda, medio-
 cris: in tertia autem circa quartum atque
 sequentibus vsque ad septimum, ad tan-
 tam peruenit duritiem, vt quispiam qui so-
 li crederet pulsui multorum fore mensium
 ægritudinem iudicaret. Talis autem per-
 durauit vsque ad vernum æquinoctium, in
 quo cœpit mollescere, & rursus postea
 quadragesimo die omnino æger à tertiana
 est liberatus, tendente paulatim ad mol-
 litiem pulsu, ac minore quotidie fiente
 accessione, vrinisque † meliorem habentibus †
 substantiam. Et hæc quoque in prio-
 re tempore erant admodum crudæ. Ta-
 lis quidem est tertiana quæ alterius ex-
 quiritæ maximè contraria existit. Reliquas
 verò intermediæ haud numero paucas,
 ex extremis quæ determinata sunt, non
 difficulter inuenies. Quæ enim in prin-
 cipio sermonis tertianarum febrium in-
 dicia

dicia scripsimus, si omnia affuerint, exquisi-
 tam reddunt tertianam. Cuius accessionis
 tēpus breue, quatuor aut quinque aut sex,
 at longissimè, vndecim aut duodecim ho-
 ras complectitur. Et huiusmodi febrium
 vring, tertio die, ad summū quarto, coctio-
 nis signum ostendunt. hoc quidē pacto ex-
 quisitam aut non exquisitam tertianam co-
 gnosces. Eadem quoq; ratione & quarta-
 nam & quotidianā. Cui enim omnia insunt
 indicia quæ in quartanis febribus antea scri-
 psimus hæc vera atque exquisita quartana
 est: cui verò minimè, spuria est & nequaquā
 exquisita. Et quotidiana quoq; cui omnia
 quæ diximus insunt, exquisita est. Quæ au-
 tem eam naturam non habet, non exquisi-
 ta. nō igitur nothæ minimeq; exquisitæ fe-
 bres diurnæ sunt, vt quotidianæ & quar-
 tanæ. Cæterū quemadmodum exquisita
 tertiana brevis est tēporis, sic & quotidia-
 na & quartana diurnæ. Hæc quidē in his
 qui per circuitum quendā febricitant, oportet
 considerare. In aliis autem febricitanti-
 bus, vrinas atque excrementa atque vniuer-
 sum corporis habitū inspicere oportet: ca-
 lorem quoque atq; arteriarum motum, &
 quæcunque alia præter hæc Hippocrates &
 lōgus vñs inspicere iubent. veluti regio-
 nes, anni tēpora, & cōstitutiones, & ætates,
 corpo

corporum temperaturas, consuetudines, & causas antecedentes, & quæ simul cum morbis inuadunt, & quæ in medio tempore apparent. iam totum cuiuspiam videri potest admonitum esse, non tamen res ita se habet. nam quiddam maximum etiam inter hæc omnia, breue tamen dictu, nondum scriptum est. Quid verò hoc est? Morbi quantitas ac virium. Res quæ ad eam rem explicandam vno indiget verbo, ad usum verò permagna est. Neque enim bene prænoscere possumus, nisi horum singulorum magnitudinem diligenter persitemus. Nam utrum morbus sit exitialis an non, & quando magis debeat mori, an sanitati ægrotus restitui, nisi omnia quæ diximus diligentius animaduertens ad duo redegeris capita, ad ipsius scilicet morbi magnitudinem & ægroti vires, non poteris verè prænoscere. Nam si vires adeo validæ fuerint ut possint morbum superare, necesse est egrotum euadere. Si verò contra, omnino morietur. Non igitur solum inspicias, qualis sit morbi species ac forma: sed & eius magnitudinem aduerte. Non paruum autem hoc exigit experientiam tum alias ob causas, tum quia neque scribi, neque omnino sermone edoceri singulorum quantitas potest. Quod si quid in nobis est, ex nulla re adeo possumus ad exquisitam peruenire notitiam, quantum ex crebra

bra exercitatione circa quantitatis conie-
cturam. Hoc quidem in ipsis operibus & di-
scere & docere possibile est. Quaecunque
verò in qualitate determinantur, hæc dili-
genter ac manifestè quam breuibus pote-
rimus verbis transigemus.

De cura febris tertianæ. Cap. IX.

EXquisitam ergo tertianam, ut quæ ex
flaua bile commota inualeſcat, quàm
maximè fieri poteſt, refrigerare oportet ac
humectare. Nam contrariorum contraria
remedia ſunt. quæ quidem quod ſuperfluū
eſt, reprimant: quod verò deſicit, ſuppleāt.
At flauæ bilis humor, omnium qui in cor-
pore ſunt, aridiſſimus calidiſſimusque exi-
ſtit. Hunc igitur quum ad ventriculū repit,
per vomitum educere oportet: quum verò
vergit ad inferiora, eodem modo per infe-
riorem excretionem. hoc quidem & ſponte
fieri ſolet in tertianis exquisitis, Per vrinā
quoque & ſudores oportet euacuare. Iuuat
autem & per inferiores partes bilis expur-
gatio. venter autem mollibus clyſteribus
exinaniedus eſt. Vrina verò, potionibus in
quibus apium, aut anetum maduerunt, pro-
uocanda. Et ſi tibi coctionis ſigna moſtran-
tur, iam cum fiducia aliquid abſynthij po-
tes exhibere. quod alioquin ſummū eſt ſto-
machi remedium vbi bilis infeſtauerit, ſi
præ

praesertim ex ipsius coma quantum sufficiat
 accipies mellicrato intinxis. Balnea vero
 calida ex aqua potabili profunt tum quia ali-
 quid bilis educunt, tum etiam quia sua qualitate
 plurimum iuuant. Nam huiusmodi balnea
 humectant ac potentia refrigerant. Marinae
 autem aquae & salinae, nitrosae atque sulphureae,
 plus quidem bilis educunt, sed multo minus
 quam potabiles profunt. Praestat vero neque
 ipsas utiles dicere, quandoquidem plus quali-
 tate nocet quam euacuatioibus iuuat. Equi-
 dem noui quendam corrupto iudicio hisce bal-
 neis uti persuasum, deinde resiccato corpo-
 ris habitu ad tantam venisse perniciem, ut tabe
 consumptus interierit. Reliqua vero victus
 ratio ad bilem etiam excernendam exhibita est. *† In vete-*
 Semper autem oportet contrarias qualita- *ri legitur*
 tes illis quae praeter naturam inualuerint op- *πός τις*
 ponere, quum hoc multo plus iuuat quam *χολής*
 quomodolibet euacuare. Sed neque hoc ipse *τὸν χολῆς*
 nouerat, neque alio docere didicerat. Hae *i. ad bilis*
 igitur in balneis intentio sit, ut corpus ma- *generatio*
 deat atque humectet, atque idcirco neque nitrum, *nem.*
 neque sal neque sinapi adiungere oportet (quod *πῶς*
 genus mali complures aegrotis afferre viden-
 tur) at ubi plurimum olei calidi infuderis, ad
 aquam perducere ac madefacere. & si in ea
 natare voluerint, quantum id facere possunt
 permittendum. At qui balneis admodum dele-
 ctan

Etatur, si etiā bis in die lauari permiseris, nō
 aberrabis. sed illud semper habeto in me-
 moria, vt tempestiuē id faciāt. Si verò etiā
 coctionis signa ostēdantur, etiam si sapius
 laueris, nihil deliqueris. A vino verò, ante-
 quam morbus coquatur, omnino abstinē-
 dum. At vbi concoqui cœperit, dandum est
 ab initio tenue, aquaticum, & paucum, vbi
 verò iam prope est vt morbus soluatur, am-
 plius est offerendum. Cibi autem quicūque
 humectant atque refrigerant, omnes vtilēs
 sunt exquisitis tertianis. Quantitas verò in
 ipsis sit tanta, vt bene cōcoqui possint. Ex
 oleribus quidem, attriplex, blitum, lapa-
 thum, & malua, & lactuca, & cucurbita. Ex
 aliis verò ptisanæ succus, & ex aliqua sorbi-
 tiones, & ex piscibus saxatiles. Ex volatili-
 bus autem, quæ mollibus cōstant carnibus.
 Quæ autem talia non sunt, eorum alæ. Te-
 † *In gra.* sticuli quoque gallorum, & suum pedes &
legitur cerebra. Paruorum verò si etiā dederis, car-
καρκὸς τὰ nes assatas: nihil nocebis. Sed & oua ad sor-
κερὰς bendum sunt offerenda, & præsertim vitel
 quod *ali* li eorum. nam hi facilius quàm pars alba cō-
coctura il coquuntur. Ex fructibus autem permitten-
 liquefa- dum est vt illos degustent qui non sunt o-
ctas car- mnino difficiles concoqui. Oportet absti-
nes inter- nere à melle, sinapi, & salitis, atq; omnibus
 pretantur acribus, & à vinis & satis vetustis, & quæ
 na

natura sunt calida. Hæc quidem sit victus ratio in pluribus veluti ad coniecturâ expōsita. Qui verò non admodum delitiosi sunt, his talis victus est instituendus qualē nosti me aliquando instituisse in exquisita tertiana secundum sermonem Hipp. ex succo ptisanæ vsque ad crīsim: hæc quidem in exquisitioribus tertianis seruare oportet.

De tertianæ nothæ cura.

CAP. IX.

IN his verò quæ nō adeo exquisitæ sunt, prouidendum est pro viribus ne morbus augeatur, neve ægrotantis vires prosterantur, quæ longiori tempore debent laborare: difficilè verò est seruare vtrunque: quoniam inedia quantum profunt ad morbi cōcoctionem: tantū vel amplius officiunt viribus. Cibi verò quantū ægroti robur adaugent tantū coctiones impediunt. Sed & id quoque noscere opus est, ad quantā magnitudinem perueniat morbus, ac quantæ sint ægroti vires: vt ad ea inspiciens quæ maius auxilium exposcunt, inedia quidem in valentioribus vtaris viribus, & morbo coctu difficili: largiori autem cibo, vbi vires sunt debiliores, neque morbus admodum concoqui contumax. Hæc quidem & in omnibus aliis morbis considerare oportet. In tertianis verò non exquisitis neque

C

statim circa initia balneare expedit, sed quū
 primum coctionis signa apparuerint. Neq;
 quotidie cibum oportet exhibere, sed al-
 ternis diebus. Quies verò & calefactio cir-
 ca præcordia iuuant, & sorbitiones conco-
 qui faciles, & clysteria nō admodū mollia.
 Quod si sanguinē mittere oporteat neque
 hoc quoq; omittendum. Sed ab initio sta-
 tim adhibita earum rerum quas scis distin-
 ctione, tātum sanguinis mittēdum quantū
 præsens exigit status. Sit autē totius victus
 ratio, nō quæ humectet atq; refrigeret vni-
 uersum corpus, qualis in exquisitis exhi-
 betur tertianis, sed & aliquē modum assu-
 mat ad calefaciendum atq; incidēdum. Plu-
 rimum igitur eos iuuat ptisanæ succus pi-
 pere adiecto, vel etiā hyssopum vel origa-
 num, vel spicam nardi mulsā infundens &
 decoquens ad bibendum propina, & quæ-
 cunque aliā prouocantia vrinā, præterquā
 illa quæ suprā modū calefaciunt atq; exic-
 cant: maximè verò post diē septimā, danda
 est iugiter absinthij coma. Et quidē oxy-
 mel potione plurimos iuuat, & aliquid ex
 his quæ molliter ventrem subducunt, qui-
 bus me assiduè vti nouisti. Vomitus autem
 post cibū, adeo his quibus hæc febris per-
 durauerit utilis est, vt multos sciam solis
 vomitibus statim fuisse curatos.

De

De curâ quartanarum.

CAP. XI.

DEinceps de quartanis dicemus: quas etiâ ab initio mediocriter ac leniter tractare oportet, nullû fortè medicamē aut euacuationē exhibentes, nisi fortè sanguis vehementer superabundans appareat. Et si vena incisa, is qui fluit, niger videat ac crassus (præcipuè verò in his qui liene laborant huiusmodi visitur) audacius mittendus est qd si flau⁹ aut tenuis apparuerit, statim suppressendus. Venam verò secare oportet, vel interiorē, aut mediā quæ est in sinistro cubito. Victum deinceps instituere sine flatibus ac optimū vētrē, quātum possibile est, mollē facientes his quæ vsitata sunt. Quod si hæc nihil proficiât, clysteribus vtēdū est, à principio quidē mollib⁹ postmodum verò acriorib⁹. Arcēdi sunt aut à carnib⁹ porcorum, atque ab omnibus eduliis quæ tenacia sunt, & tardū habēt exitū, ac quæ refrigerāt exiccātq; corp⁹. Vino verò vtēdū est albo ac tenui ac mediocriter calido: & volatilib⁹ quæ boni succi sunt, & nō in paludib⁹ degūt. Pisces aut adhibēdi cōcoqui faciles molles carnib⁹ nihil tenax habētibus. Vtēdum est autem salsamentis & sinapi. Et certis diebus, id medicamen quod diatrion pipereon vocatur, vel diospoliticum est

assumendum. Et si quotidie piper tantum cum aqua biberent, rectè etiam facerent A frictionibus autè & ambulationibus & balneis atque aliis vſitatis non sunt penitus prohibendi. Et si omnino possent à balneis abstinere, solis contenti frictionibus, quā plurimū ex eo iuuamen admitterent. Et si quartana febris brevis sit, neq; admodū violenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad consueta exercitia se transferant. Hæc quidem ab initio & vsque ad statum sunt peragenda. Si verò in statu morbi præcipuè ægrotus esse videatur, tunc subtilioris vſus ratio est adhibenda quā antè vel post. Statim verò præcipiendū est vt diu cōquiescat, ac visceribus prouidendum, vngendo atq; emplastrādo his quæ mollire ac laxare possint: deinde medicamentis vtendū, quæ ciendi vrinam vim habent. Et si coctionis morbi inditia apparuerint, tunc purgare oportet his quæ humores atros exinaniēdi vim habent, non semel tantū, sed sæpius si fuerit necessariū. Vtendū autè & vomitibus statim à cibo, & si nihil prohibuerit, elleborū album est exhibendum, primū quidē permixtum † radicibus, quòd si nihil profecerit, elleborum ipsum. Qui verò nequeunt euomere, hī per inferiora vehementius sunt purgādi: hisq; deinde medicamen
confe

† ράξι-
σιρ.

confectum ex viperis in potu dandū, & alia
 quæ ad huiusmodi febres cōmendantur,
 ex quib⁹ est & illud nobis familiare præ cæ-
 teris, laudatissimū, quod succū cyrenaicum
 recipit. Quicunq; verò ab initio aliquid ex
 his medicamētis exhibuerunt, aut omnino
 ante statum, quartanā quæ erat simplex fa-
 pius fecerunt duplicem, aut omnino maiore
 ac difficiliorē: ex duplici autem: triplicem,
 aut omnino ambas difficiliores maioresq;
 reddiderunt. Noui autem medicū qui au-
 fus est homini qui triplici quartana labo-
 rabat, medicamē ex viperis exhibere, quā-
 do nondum morbus in statu esset: deinde
 (vt par est) auctis omnibus, febris conti-
 nua subsecuta hominem occidit.

De cura quotidiana.

CAP. XII.

Quotidianā aut quū volueris curare,
 oxymelite† vt ere post primos dies † *Ally le-*
 & illis quæ probè possunt vrinā validè cie- *gunt non*
 re. Et vniuersum totius victus caput sit ad *χρῶμετα*
 incidendū efficacius. Circa statū verò, de *τας πρῶ-*
 ventriculo est habēda sollicitudo, ac de eius *τας κμι-*
 ore præsertim; deinceps iubendum est vt *τας, sed*
 post radices & cibos assumptos euomant, *χρῶμεθα*
 his etiam quæ pituitam subducunt vt edum *τας πρῶ*
 reliquam verò victus rationem ad commu *τας κμι-*
 nes intentiones inspiciens, inuenies. *τας.*

i. utimur
primis die
bus, cui le-
ctioi asti-
pulator
Pau. libro
2. ca. 24.

De cura febrium continuarum quæ carent
accidentibus. CAP. XIII.

Continuas autē febres quibus quidem
status morbi nō ultra septimam futu-
rus est, & vires validæ sunt, atque ætas con-
sentit, his quidē admodum exquisitus & te-
nuis victus est instituendus. Quibus verò
vel status totius morbi longius abest à se-
ptima, aut vires robustæ non fuerint, hi ab
initio vberiori cibo sunt reficiendi, propè
verò statum, tenuiori. Quum autem iam
adeo status, tenuissimū victū servare opor-
tet, deinde rursus semper vberiozem: ac po-
tius simile augmentum rursus efficere, huic
qui antè statum fiebat decremēto. Sangui-
nem verò mittere oportet & ob morbi ma-
gnitudinē. Et quibus rubor multo plusquā
naturæ conueniat, & maior quam pro con-
suetudine totius corporis tumor, & venæ
eminentēs atque extēsa, his est auferendus,
nisi vires aut ætas aut aliquid eorum quæ
suprà commemorauimus, prohibuerint.
Quod verò humidus victus in febribus
acutis omnibus iuuat, pridem rectè dictum
est. Cremorē igitur ptisanæ, his quibus non
acescit exhibere oportet, & mellicratū qui-
bus non bilescit & sorbitiones ex alica, &
panem ex aqua, & quæcunque alia eandem
aut similem vim habent. Quæ præter mo-
dum

dum calidæ & ardentes sunt, quum primū videris coctionis signa, tunc audacter aquā frigidam potandam exhibe: modus verò in quantitate seruetur, quemadmodum tempus anni, regio, ætas, & natura: & consuetudo etiam exposcit. Talis quidem est, vt in vniuersum dicam, febrium quæ accidentibus carent curandarum ratio.

*De curatione febrium cum
accidentibus.*

CAP. XIII.

QUæ verò cum accidentibus sunt, nõ æquè simplicem exigunt curationem. At pro viribus metiendum est quanta sit febris, quantumve ex accidentibus periculum immineat: atque ad id quod vehementius ac difficilius, intendendum, non posthabita omnino etiam alterius cura. Age enim, si quis febricitet [et eorum qui non sunt habitus plenioris], verum ex recenti ^{†Locus in}bus cruditatibus angorem quædam sentiat ^{græcis cod.} ac morsum, atq; os ventriculi pressum, vel ^{impres-} si etiam humorẽ aliquẽ malum euomuerit, ^{sis legitur} & in huius transitu non parum fuerit offen ^{negatiue,} sus adeo vt difficilẽ ferat atque molestẽ, ^{sed in ve-} nunquid hic ad febrẽ respicientes, solã mul ^{teri legi-} titudinem euacuare tẽtabimus? quod alio ^{tur affir-}quin sine molestia faceremus, an prius ori ^{mativ ext}

sit verten ventriculi prouidebimus? ac postea sic, vbi
 dum, ad- circa hoc bene se habuerit, quā licuerit to-
 sit autē ea tius corporis euacuationē faciemus? Mihi
 dispositio quidē ita agendum videtur. Multos itaq;
 quæ phle- vidi qui ita affecti erāt, quosdam interiisse,
 torica ap- nonnullos ad extremū periculū fuisse per-
 pellatur. ductos, quum medici eos vacuare tētaissent
 antequā os stomachi corroborassent. Sed
 neque si fuerit febris cum profluvio vētris,
 alia est opus euacuatione: verū hęc sola
 sufficit, quāuis non sit pro multitudinis ra-
 tione. Quicunque enim his plus adimere
 fore necessarium putantes, aut sanguinem
 mittere aut ventrem mouere tentarunt: in-
 grauiora pericula duxerunt. Sed neque si
 quis simul & distentione neruorū laboraue-
 rit, & sanguis eguerit missione, neque huic
 tantum semel mittere oportet quantū exi-
 git morbus, sed aliquid etiam accidenti est
 relinquendum cuius causa saepe sudores eue-
 niunt, & vigiliæ molestant, & vires ægroti
 debilitantur. Ita etiam si vehemētes vigiliæ
 aut dolor intēsus ægrotū infestāt, cauēdæ
 sunt subitæ ac multæ euacuationes. Ipsa
 præterea ambiētis aëris tēperies loco acci-
 dentis cuiusdā habenda, quando exquisitè
 calida ac sicca fuerit, qualis est tēpore me-
 dio inter canis ortū & arcturi: atq; ideo oēs
 quibus medici nihil omnino de temporum
 statu

statu cogitantes sanguinem abstulerunt, in-
 terierunt. Si etiā valde frigida fuerit, tunc
 quidem sanguinem mittere est formidan-
 dum. Neque illud ignorare oportet, non
 parua ex similibus rebus sequi pericula
 interierunt autem nonnulli qui in calidis ad-
 modum temporis constitutionibus non re-
 ctē euacuātur, ex defectu animæ, quē synco-
 pen vocāt, & dissolutionē. In frigidis verò
 cum accessiones incipiunt, vehementer re-
 frigerati nequeunt tolerare. Ob hæc igitur
 neque in locis suprā modum calidis aut
 frigidis, sanguinem mittere audemus. Sed
 si regioni temporis status cōsentit omnino
 abstinemus: quum verò non consentit, eua-
 cuamus, quidem sed multo minus quam si
 neutrum prohiberet. Tanquā etiā accidens
 quodā agrotātis, ad patiēdum facilitatem
 cōsiderare est necessarium. Multi enim
 neque vnquā fuerunt euacuati, neque eua-
 cuationē vllam integrā, aut inediā lōgam
 possunt perferre, sed aliis quidem ob ista
 facilē totius corporis robur labefactatur:
 aliis verò os vētriculi malē afficitur, adeo
 vt cibos abhorreant: quod si eos cogantur
 assumere, aut nō retinent, aut male conco-
 quunt. In hac dignotionis parte, etiā agro-
 tātis temperaturā cōtēplari oportet. Qui-
 cunque enim calidi & sicci natura sunt, hæ-

omnes facillè ab integris euacuatiõibus of-
fenduntur. Et cõsuetudo quoq; non parui
momēti est, cum ad omnia alia, tū præcipuè
ad euacuationis indicatiõē. Quidā enim
nunquā prius fuere euacuati, neq; vnquam
euacuationē integrā pertulerunt, & multis
cibis vñ sunt. Nōnulli cōtra, neq; multis ci-
bis vñ fuerunt, & euacuatiõibus sunt as-
sueti. Hos igitur intrepidè euacuare opor-
tet quādo & reliqua etiā cōsentiunt: alios
verò, nec si omnia alia id suaserint. Eodem
pariter modo & corporis habitus cōfide-
rare oportet. Nam qui dēsa & solida carne
cōstāt, his habitus haudquaquā facilis pati.
Quare nō oportet vereri ipsos euacuare ex
toto, si quidē & alia id iubent. Sed qui mol-
lem & tenellā & diffluentē habent carnē,
hi mirum in modum sunt ad patiēdum ha-
biles. Quare & si reliqua omnia sanguinē
esse minuēdum persuadēt: nō tamē id face-
re audendum est: sed aliis euacuatiõibus
quātum moderatè & cōsideratè fieri pōt,
utēdum est. Eodē modo & quicunq; supra
modum crassi sunt aut macilēti: nam & his
venā incidere cauēdum est, aliasq; euacua-
tiões integras vereri oportet. His etiam
& ætas annumeranda est veluti accidens
quoddā, quod prohibendi integrā vacua-
tiõē vim habet, neq; enim pueri, neq; senio

res hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes quos diximus, ubi dispositiones horretur, non semel neque ex toto, sed paulatim oportet euacuare inediis moderatis & frictionibus, & clysteribus mollibus, humectationibusque & cataplasmatibus & balneis. Quorum singulorum indicationes rursus ab his quae antea diximus, sunt assumenda. Ita etiam si quando duo contraria accidentia consequantur, inspicere oportet utrum eorum sit fortius. Eodem modo si duo morbi eundem hominem obsederint, qui invicem pugnares habeant indicationes. Nam & tunc quoque aduersus id quod magis urgeat instandum, neque alterum omnino negligendum. Eas vero quae habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundum causam a qua singula sunt considerandum, qualia sunt defectus animi & dissolutio. Nam consuevit re medici de vna re haec duo nomina dicere. Est igitur res ipsa quidem vna, eius vero sunt plures causae. Nam animo deficiunt & in morbo cui cholerae nomen est, & in profluuiis ventris, & difficultatibus intestinorum, ac laevitatibus, & muliebri fluxu, & vulneribus, & haemorrhoidibus emanantibus & reiectionibus sanguinis, aut profluuiis sanguinis per nares aut alios meatus, & in matricis post partum purgationibus immoderatis.

Non

† Apople-
xiam.

Nonnunquam verò & vehemens cruditas animæ defectum attulit, & tunc præsertim quum ventrem supra modum soluerit. Et qui morbus bulimos appellatur, nihil aliud est quam animæ defectus. Omnem præterea quæ ex matrīce prouenit strangulationem, defectus animi antecedit, sicuti ad matricis versus superiora recursus & ad latus inclinationes atq; inflammationes plerunque consequitur. Antecedit autem morbum attonitum, & comitiale quum malignior existit, & resolutiones, & syncopen, & tabem. Sed & in principiis februm non admodum paucarum aduenit, & tunc præsertim quum supra modum aut siccum & squalidū aut plenū immoderatè corpus extiterit. Et nonnunquā etiam simul cū febre ardente atq; maligna inuasit: & quibus extremæ corporis partes in accessionibus februm plurimū sunt refrigeratæ. Et quicūq; ob inflammationis magnitudinē vel hepatis, vel ventriculi, vel stomachi febricitant, his etiam in principiis accessionū animi defectus adueniunt: illis præsertim quibus humores crudi minimeq; cocti redundant: aut qui aliquā præcipuā partē obstruatam habēt. Animo etiā deficiūt quibus os ventriculi malè affectū est, aut humorū vitio mordicatur, aut crassis, aut lentis, aut humi

humidis vel frigidis humoribus aggrauatur. Quidā etiā in vehementibus animi affectibus animo defecerūt, sed præcipuè senes, & qui alioquin sunt imbecilles. Etenim plures eorū tristati, aut lætati, aut irati animo defecerūt. Est verò vbi rorida humiditates quādā his ita affectis haud in tēpore superueniētes, animi defectū inducunt, sicuti & qui magis robusto sunt corpore, ex immoderatis sudoribus idē patiuntur: & si abscissus quispiā terumpat, *vires vehementer lædit, ac tū præcipuè quā materia simul tota ad ventriculū vel vētriculi os aut thoracem defluxerit: Et si quādo etiā nos abscissus fecantes, totum simul emittere tentauerimus, animi defectum subsequi est necessariū. Et si quandoq; purgantes, aut clystere abluentes, aut quomodocunq; euacuantes: id aliquo modo vehementius quam oporteat egerimus. Neq; enim morbo inter cutem tota simul humiditas (quāuis ea superfluitas sit præter naturā) potest sine noxa euacuari, sed tūc quoq; necessariū est hominē deficere animo. At verò ex vehementia dolorū veniūt dissolutiōes, quum morsus quidā ac tormina, aut ilei, aut intestini crassioris affectus subitò accidūt. Sed & nervus percussus & musculi caput, animi defectū intulerunt: & maligna in articulis

† παρειν. i. rumpatur
* In ant.
† αμρ πω & ου πω δ' υ
† αμρ ισ-
† υρ α. i. ei
qui nō ad
modū va-
lidis sit vi-
ribus. Et
ita oīo le-
gendū est
† τοις υδι
† οις, id est
aqua iter
cutē labo-
rantibus.
* in imps.
† αλκῆς.
in ant.
† αλκῆς
i. ex diu-
turno sto-
machi vi-
tio alui
fluor.

ulcera

vlcera omniaq; gangrenosa, & depascētia,
 & immoderata quædā frigiditas, aut calidi-
 tas, vitalisq; roboris dissolutio, hæc quidē
 sunt defect⁹ animi causæ. Atq; singulæ ea-
 rum propriam curā desiderāt. at de omnibus
 quidem nunc scribere nō est opus. nā quæ
 passionibus assidēt, sine illis curari nō pos-
 sunt. Tātum igitur in præsentī sermone de
 ipsis dicemus, quātum edoctus quispiā pos-
 sit his quæ repētē ingruunt, accessionibus
 occurrere. Veluti, verbi gratia, eos qui ex
 choleris, & vētris profluvio, & aliis tū largē-
 tum impetu vno factis euacuationibus dis-
 soluuntur, frigida spargere oportet, & na-
 res cōprehendere, & os vētriculi perfrica-
 re, ac iubere vt euomat stomachum irritan-
 do digiti vel pēnæ immissiōe, sed & manus
 & pedes alligare. Oportet autē nexus fieri:
 ¶ *In ant.* plures quidē, ac fortiores circa manus, quā
oxia, id do per inferiores partes fiunt euacuationes:
est crura. quēadmodū in hæmorrhoidibus, & vētris
 profluvio, & quæcunq; per matrices fiūt in
 mulieribus vacuationes. Nā si tunc crura
 fortius ligētur, sapius aliquid ad partes in-
 feriores attrahitur. Contra autē fit in fluxū
 bus sanguinis factis per nares atq; vomiti-
 bus, vbi plures ac vehemētiores ligaturæ
 in cruribus fiunt: & quidem quibuscunq; in
 vulneribus sanguis emanat. Eodē modo si
 ex

ex superioribus partibus accidat, inferiores: si ex inferioribus, superiores vinculis sunt astringendæ. Situm quoq; aliquê in aduersum tendentē parti expedit inuenire, non tamē hoc multū fiat. Nā si nimium tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilominus irritatur quā si inclinaret ad eundē. In vniuersum autē, aut ad cōmunia mēbris patientibus in aduersum trahere oportet, aut ad ea in quibus est [†]euacuationis origo. Atq; [†]Videtur
 ideo vehemētes euacuationes quæ ex ma- ^{legendum}
 tricibus sūt, cucurbitulæ mamillis apposi- ^{esse fluxio}
 tæ statim sedāt. Quæ verò ex naribus, he- ^{nis.}
 pati ac speni secū dū narē patiētem, quòd si
 ex ambabus natib⁹ simul plurimus sanguis
 efflueret, vtriq; visceri sunt adiciendæ. Vi-
 num etiam aqua frigida temperatum curat
 eas quæ ex magnis sūt euacuationibus dis-
 solutiones, & tunc præsertim quādo ad vē-
 triculum fluunt humores. Sed aduertendū
 est an aliquid sit quod prohibeat huiusce-
 modi exhibitionē, veluti si aliquod ex vi-
 sceribus inflātionem patiatur, aut caput
 vehemētius doluerit, aut passio aliqua quæ
 delirare cogat affuerit, aut febris ardēs in
 morbo crudo. Magna enim & quasi insa-
 nabilia ex potu vini in huiuscemodi affe-
 ctibus nocumenta proueniunt. Quòd si
 nihil prohibeat, postmodum ægrotan-
 tis

tis naturam & consuetudinem & ætatē &
 ambientis aëris temperaturā considerare
 oportet. Ad hæc enim respiciens, vel frigi-
 dum, vel calidū potum exhibebis. Nā qui
 assueti non sunt potare frigidū, aut mani-
 festè ex ipso offenduntur, & quicunq; natu-
 ra sunt frigidiores, & qui in extrema sunt
 senectute, & loco degunt natura frigidiori
 & tēpore hiberno, cauere frigidū oportet,
 at qui cōtrario modo se habēt, hisce intre-
 pidè offerre. Sit verò vinū in fluxionibus
 quæ ad ventriculum sunt, calidū & tenue,
 quale lesbium. In sanguinis autē fluxibus,
 crassum ac nigrū & acerbū. Ipsis verò lo-
 cis imponere oportet, veluti vētriculo, &
 matrici, & stomacho, & thoraci quæ corro-
 borādi vim habent, capiti autē & frōti, præ-
 ter hæc, illa etiā quæ refrigerāt. Et quibus
 vel in summis partibus, & in naribus vena
 aliqua disrupta est, medicamen aliquod ex
 his quæ sanguinem suppressere possunt,
 imponendum. Balneæ verò in fluxionibus
 quidem ad ventriculum aptissimæ sunt, at
 sanguinis verò fluxum acriter irritant. Et
 quicunque ob sudoris multitudinem animi
 defectum patiuntur, his etiam plurimum
 nocent, hos enim astringere oportet ac re-
 frigere, ac non laxare cutem, & vinum fri-
 gidum præcipuè his exhibere, † neque ali-
 quo

† In gra.
 l egitur.
 επιπολῆς.
 id est su-
 perficie.
 † καὶ μὴ
 διὰ βλαψ
 πρῶσι
 παρ θερ-
 μόν, id est
 & nihil
 oīo calidū
 offerre.

quò pacto calidum offerre. Sed neq; etiam
 artus ligare oportet, neq; cogere ad vomitum,
 neq; vlllo modo mouere. at ventis refrigerantibus
 aditus præparare, aërē quoq; domus alterare
 frigida atque acida qualitate, myrtorum frondibus,
 & vitium capreolis, ac rosis pauimentum cōsternentes.
 Nihil verò horum cōfert vbi ad ventriculum
 fluxiones fiunt. nā quo magis cutē densaueris,
 tanto ipsæ magis augentur. His igitur qui ex euacuationibus
 dissoluuntur, ita cōfestim succurrendum est. At qui ex multitudine
 laborant, non ita, verum in illis artus quamplurimum
 fricare oportet, calefacere atq; alligare. A vino
 verò & cibis abstinendum, & balneis etiā si febricitauerint.
 Suficit autē si eis dederimus mellicratū potū,
 in quo ebulliuerit thymus, vel origanum, vel pulegiū,
 vel hyssopus, cōuenit quoque oxymel, [& ligare ac
 fricare manus potius quā crura. Et quæ etiā ex matrice
 laborant atque exoluuntur, non aliter curandæ sunt
 excepto exymelle, fricare etiā atq; alligare magis
 crura oportet quā manus, & quemadmodū in multo
 effluxu cucurbitas mamillis imponimus, sic quibus
 vterus aut sursum aut ad latus trahitur, in
 guinibus, & coxis adhibebimus: & naribus quidem,
 ea quæ foetidissimū odorē habent, matricibus

Hæc in

græ. non

habentur.

† In græ.

ē αἰς ἀνέ-

σπασθαι

καὶ τὰς

ματρίας

D

autē odorata, ea etiam quæ laxare ac calefa-
 cere possint medicamēta afferemus. Si ve-
 rō os ventriculi fuerit imbecille, atq; ideo
 animi sequatur defectus, ea quæ roborādi
 vim habent oportet emplastra adhibere,
 quale est quod fit ex palmulis, vino, farina
 hordei, croco, aloë, ac mastice. Madefacere
 autē his quæ cōstant ex absinthio, & oleo
 melino, & masticino, & nardo, † & vino. Et
 si exuratur, miscere ex refrigerantibus ali-
 quid, veluti cucurbitæ succū atq; lactucæ,
 & portulacæ, & solatri, & * intybi, & vuar
 acerbæ, hæc quidē nō solū refrigerat, sed
 etiā astringit. Aqua etiā frigida plerunque
 iuuat affectos stomacho si opportunē de-
 tur, alioquin plurimū obest. Atq; his qui os
 vetriculi imbecillū habent, vinū calidum
 potius oportet exhibere, si nihil sit aliud
 quod prohibeat. Plurimum verō iuuat eos
 qui ita laborāt, etiam frictio extremorum.
 Quod si ex his remediis nihil melius se ha-
 buerit, eos quidē qui adusti sunt quāprimū
 ad balneas ducere oportet, Qui verō aliqd
 frigoris sentiūt, medicamēta trion pipe-
 reon nominatū, atq; ipsum piper solū, atq;
 † absinthiū bibant. Qui verō ex vitiosis hu-
 moribus os vetriculi mordicantibus disso-
 luūtur, hos post aquæ calidæ, aut hydrolei
 potum fac euomere. Quod si difficulter
 euo

† Additur
 in græ.
 nā dīdēv-
 ōng. id est
 ex ænan-
 the, sed in
 impres.
 corrupie
 legitur.
 dīdēv ōng.
 * oīpīs.
 * Addit
 ant. dīdēv
 paxxāp. i.
 in declina-
 tione.
 † In ant.
 additur
 pōvs, id est
 solum.

euomant, prius cōcalefacere oportet quæ
 os ventriculi circumstant loca, & manus, &
 pedes. Quod si neque hoc modo possunt
 euomere, digitos aut pēnas demittēdo irri-
 tare oportet, quod si neq, sic euomant, rur-
 sus his oleum calidum quā optimū exhiben-
 dum. Solet autem sapius oleum nō solum
 ad vomitū irritare, sed etiā ventrē mollio-
 rem facere. Non parum enim ad præsens
 est vtile. Quare nisi spōte accidat, arte pro-
 curandum est: præcipuè verò † & appositis † τοῖς πρῶ
 hoc tētādum est facere. Quod si ex istis fa-
 cilius fiat etiā absinthij comam in mellicra-
 to decoquēs ad potādum exhibeas, atque
 deinceps vinū, deinde omnibus modis mē-
 bra oportet corroborare, partim his quæ
 extrinsecus apponūtur, partim absinthij po-
 tionibus, nō tamen id in principiis faciendū
 suadeo, sed postea, quando circa ventrem
 partes fuerint expurgatæ. Quando verò
 adhuc humores in ipsis continentur, non-
 dum astringere, sed tantum concalefacere
 (vt antea diximus) cōuenit. Vbi verò mul-
 ta pituita in ore vētriculi fuerit acervata,
 fouere quidē plurimum oleo in quo absin-
 thium ebullierit: postea verò mellicratum
 exhibere, in quo vel hyssopū, aut aliquid si-
 mile infusum sit, itē oxymel, & piper, & dia-
 trion piperis & dio spolicō medicamē:

viētus ratio in summa incidēdi vim habeat. Quæ verò ex nimia frigiditate veniūt exolutiones, eodē modo curādæ sunt quo bulimi, omni modo calefaciēdo. Vinum igitur eis exhibere oportet calida tēperatū, ac cibos qui calefaciendi naturā habent, fricareq; ac calefacere ad ignē simul, Qui verò ex nimio calore accidūt animi defectus, his quæ refrigerādi ac corroborandi vim habēt, hi verò maximè eueniunt iis qui in aēre suffocante ac balneo cōmorantur. Statim igitur ipsos corroborabis si aqua frigida sparseris, & flabellaueris ad vētū cōuersos, & os vētriculi perfricaueris, atq; agitaueris, ac postmodū vino ciboq; refeceris. At qui ob inflāmationis magnitudinem aut vehēmētis febris malignitatē, animi defectū patiuntur, & in principiis accessionū refrigerātur, his artus fricare fortiter, & calefacere, cruraq; ac manus alligare, a vigilias cibiq; & potus omnimodam abstinentiā præcipere oportet. Optimum verò in his quid futurum sit præcognoscere, atq; hæc antè accessionem facere anticipare. Eos etiā qui ex siccitate in principiis accessionum defectū animi sunt incurfuri, optimum est præuidere. nā si duabus aut tribus horis antè accessionē exhibito cibo manus ac pedes constringi iusseris, nō interibunt. Oportet autem

rem cibos esse cōcoqui faciles & vētriculō
 aptos. Quōd si magnū imminere periculū
 fueris suspicatus, vinū dare anticipabis, vi-
 numq; præsertim in alicam elixatam infu-
 sum, quōd si aliquid panis alicæ vice exhi- *† In ant.*
 bueris, idē valebit. At si mediocriū animi *ἀέτον π*
 defectu expectatur, vino parcēdū, sed suffi *χόνδρου.*
 cit tūc mala punica, aut pira, aut mala aut a- *id est pa-*
 liquod aliud pomū quod vim habeat a strin *nem ex a-*
 gendi. cibus admiscere, & si ad hæc medio- *lica.*
 criter tulerint accessione, quū rursus cibū
 obtuleris, nō erit necessariū ponis vti, hæc
 quidē facienda sunt si quid futurū præuide-
 ris. At qui ex inopinato in periculū incide-
 rint, vinū calidum & panis est exhibendus,
 & parum aliquid cū eo alicæ calidæ. Nam
 si his qui ita affecti sunt amplius obtuleris,
 aut cibos difficiles concoqui, nō modò de-
 fectum animæ patientur, verū etiam stran-
 gulabuntur. At qui animo deficiunt ex mē-
 bri toportuni obstructione, his oxymel da *ἰθικαίρου*
 re oportet, atq; ex hyssopo, origano, pule- *id est præ-*
 gio, & melle potum, cibosq; incidēdi natu- *cipui.*
 ram habentes. Nam crassi ac tenaces, ma-
 gnas in talibus afferūt noxas. Sed neq; de-
 terius fuerit artus perfricare atq; alligare.
 Prodest etiam hisce potibus vti, qui vri-
 nam ciendi vim habent, veluti qui anetū, &
 feniculū, & apium & petroselinū, & ammi;

& daucum, & spicam nardi recipiunt. Quæ
vbi manifestè iuuerint, iam vino vtendum
est albo & tenui, non admodum antiquo. No-
tices verò huiusmodi obstructiones, cum
ex aliis inæqualitatibus pulsuum, tū ex his
præcipuè quæ secundum magnitudinē, par-
uitatem, ac vehementiā, & debilitatē fiunt,
vbi humorum plenitudo non adiungatur.
nam & istius quoq; cōmunes sunt. fiunt ve-
rò & in huiusmodi dispositionibus quum
vehementes fuerint, pulsus intercidentes.
hæc quidem in libris de pulsibus à nobis la-
tius explicantur. Nunc verò transgredia-
mur ad eum sermonem qui superest de reli-
quis exolutionibus: veluti quæ ex abscef-
sum disruptione aut sectione contingūt,
aut ex superflua euacuatiōe in his qui aquā
intercutem patiuntur. confestim quidem hi
optimis odoribus fouendi sunt. paulò pōst
autē sorbitionibus concoqui facilibus sunt
reficiendi. Si verò ob tristitiā aut gaudiū,
aut timorem, aut iram, aut terrorem exol-
uantur: odoribus, & nariū apprehensionibus
sunt reuocandi, cogendiq; ad vomitū. Eo-
dem pariter modo, qui ex vulneribus, aut
purgationibus, aut doloribus qui in articu-
lis, neruis, & musculorum chordis eueniūt,
exoluuntur, statim sunt ab eo affe ctu reuo-
candi. postmodum verò, conueniens passio-
ni

ni cura est afferenda. Animi verò defectus qui intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus vehementibus cruciatibus fiunt, ex patientiū locorū cōcalescentionibus maxime, fricationibusq; extremorū præcipuè curantur. At quæ ex propria imbecillitate virium quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex intēperatura videlicet facta partiu de quibus vires proficiscuntur, cōtrariis curare intēperaturis oportet, frigidas quidem concalescentes, calidas verò refrigerantes: atque in aliis eadem ratione. Virtus igitur quā vitalem vocant, quam ex corde prodire ostēdimus, ex pulsum debilitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, ac naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus ab initio aquosis atq; tenuibus, postmodū verò crassis ad modum fecis. At quæ ex cerebro originem ducit, quam præcipuè nōnulli animalem appellant, ex motuum voluntariorum imbecillitate deprehenditur. Sed de his quidem dispositionibus in alio tractatu separatim tibi scribemus. Multa enim in ipsis à medicis sunt prætermissa.

De cura capitis à variis causis mo-

lestati. Cap. XV.

QVoniā verò sermonē de accidētibus hucusq; perfecimus, rursus ad primū institutum redeamus, vnā in omnibus cō-

munem intentionem habentes, causas à quibus fiunt eorum singula considerare. hæ si quidem tibi conuenientem curationē ostendent. Veluti si quis doleat caput, ⁊ si quidē [stomachus] & nauseam, & erosionem sentiat, iubendum est vt euomat. nam vel bilē euomet, vel pituitam, vel vtrumq;. Quod si quidē si nulla insignis appareat in ventriculo paucos fasti fio, cōsiderandum nunquid multitudo vel diat, ⁊ obstructio aut inflammatio aliquarum capitis partium adsit. Inuenies verò, primū quidē si interrogaueris nunquid dolor per totum caput extendatur aut alicui particulæ fortius infideat, deinde nunquid cū grauitate vel tēsiōe, & mordicatione, vel pulsu. nam qui cū grauitate dolores fiunt, multitudinem ostēdunt. qui autem cum mordicatione, vel vaporis, vel humoris acritudinem: cum pulsu verò, inflammationē, at cū tēsiōe, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus crudi ac flatuosi multitudinem. Si verò cum pulsu, corporis membranosi inflammationem. at si grauitas adsit, multitudo intra membranas contenta significatur. Quum igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum singula fiunt, considerare oportebit. illa enim tibi modum curationis ostēdet. Veluti si multitudo vaporis atque humoris contineatur, aduertere oportet nunquid

quid ob magnitudinē febriū humores dif-
fusi, ac veluti efferuescentes ad caput asce-
derint, aut propter eius partis imbecillita-
tem, aut ob totius corporis plenitudinem:
Hanc enim totius corporis euacuationibus
haud difficulter curaueris. Eū verò qui ex
partis imbecillitate cōtingit partim quidē
in contrarium trahendo per totum corpus,
partim ipsi parti remedia adhibendo. In cō-
trarium verò trahes clysteribus acribus, &
nexibus, & frictionibus in partibus inferio-
ribus plurimis: & si expedierit, aliquid etiā
sanguinis abducendo. Partem autē sanabis
eo tēpore quo ad vniuersum corpus retra-
his, his vtēs asperginibus quæ à capite vim
repellendi habent: ac deinde euacuantibus,
postremo verò corroborantibus. Repellit
autē oleū quod immaturū nominatur aut
tale aliquid simile, & quod oxyrhodinum
& rosaceum vocatur, ipsum per se ipsum, &
quæcūq; ex capitibus papaueris, & teneris
oliuæ germinibus, & hederæ corymbis, mē-
thaque viridi, & sisymbrio sunt. Utendum
verò ipsis, in multitudine quidē crudiore
ac frigidiore, tepidis: in calidiore autem &
biliosiore, frigidis. Euacuat autem, atq; dis-
soluit & oleum calidum ipsum per se ipsum,
magisque si antiquum fuerit & sicyonium,
aut anethum in ipso ebullierit. Nā multi-

rudo humorum qui non admodum sunt crassi atque tenaces sufficienter huiusmodi euacuatur. Sed & si spondylium, vel serpillum intus decoxeris, aut pulegij comam, vel calaminthæ, vel menthæ, vel sisymbrij, ita etiam id quod crassius est, euacuabis. hæc verò ipsa, virium etiam aliquid membris adiciunt & quæ debilia sunt roborant. Utendum verò ipsis deinceps usque ad integram sanitatis restitutionem: & si oportuerit, per nares etiam & palatum expurgandum. Sternutamenta etiam sunt excitanda. Et si ad balneas hominem induxeris, siccis sindonibus caput est perfricandum, salque, & nitrum, & sinapi sine oleo imponendum. Hæc quidem sunt ex particulæ debilitate, doloris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine februm accidit & medicamenta adhibere est necessarium, frigida qualitates ac vires, & quæ ex hydreleo, & oxyrhodino, & papaverum capitibus constant infusiones, expediunt. In dolore autem capitis qui sanguinis fluxum aut vomitum decretorium significat, non remedia querenda, neque enim accidens quoddam, sed bonum signum potius tale quicquam est existimandum. sicuti & multa alia quæ ante crises contingunt, quæ plurimis quidem terrorem incutiunt, bonum tamen quoddam ostendunt. Optimum verò posse digno

agnoscere ubi corpus perturbatur à natu * In gre.
 ra, cum ad alias excretiones, tum præsertim *impres. le-*
 ad vomitum, & sanguis fluxum molliente: *gitur omo*
 quorum inseparabile iudiciū est capitis do- *χο μενο-*
 lor. Diximus autē plenius de hisce omni- *in antiq.*
 bus alibi. Nunc verò quantum poterimus, *τυφο με-*
 primum seruātes institutū, breuiter de ipsis *voι vira-*
 transigemus. Considerāda igitur, primum *que vox*
 quidem species febriū an calidæ sint an viē *significat*
 tes. Nā hæ per excretiones iudicari consue *incēdētes.*
 uerunt. quēadmodum quæ molliores sunt *† Ita legi-*
 ac* summerse quodammodo diu durāt, & *tur i gre.*
 sapius feruntur in abscessus. Secūdo loco, *si enim*
 an morbus sit ad salutē decliuis. quis enim *principij,*
 bonā crīsim in morbo pernicioso expecta- *vel augu-*
 uerit? Tertio ad hæc, totius morbi tempus *menti ad-*
 cōsiderandū† vel enim in principio est, vel *est signū,*
 in augumēto, quod si nōdū affuerit status, *nōdū autē*
 neq; coctionis signa in urinis, vel sputis, vel *status.*
 *abscessibus apparuerunt, non cōtingit bo * *Malē le-*
 nam fieri crīsim. hæc sunt ex quibus spera- *gitur in*
 uerit quispiam, morbum per excretiones *græc. im-*
 crīsim habiturum. Eius verò quod iam in- *pres. απο-*
 stat non amplius futurū est, hæc signa sunt. *συμταρ,*
 Difficilis quædam tolerantia omnem cri- *pro απο-*
 sim antecedit. Et si quidem in die, crisis ef- *πατημα-*
 se debet noctu: si autem noctu, in die. Si ta- *τε. p. i. ex-*
 le aliquid videas, considerandum est quo- *crementis*
 tus sit ægritudinis dies. Quidam enim
 sunt

sunt qui ad crīsim apti sunt, paruo etiā motu à natura accepto. Multi verò in magnis motibus nequeunt omnino magnitudinem perturbationis inspicere nunquid sit secundū diei naturam. Nā septimus dies, etiā ex paruo naturę apparatus, ad crīsim p̄ euacuationē mouetur. Sexto verò magno apparatus indiget, & sæpe neq; vlla in eo sit crīsis, quod si fiat, neque sine periculo, neque fideliter accidit. Sic autem & vnicuiq; dierum aliorum quædam inest propria natura, quam, vbi de diebus decretoriis agitur, definiuimus. Age, iam sit dies pro magnitudine perturbationis deinde oportet considerare qualis erit crīsis. De aliis igitur nihil impræsentiarum dicere oportet. at si vomitus aut sanguinis fluxus ex naribus futurus est, nam huiusmodi crīsis vnū diximus esse signum dolorem capitis, ex his maxime distinguere oportet. Primum quidem si statim ab initio non inuasit sicut quoddā ægritudinis accidens, sed ante crīsis perturbationem. deinde etiam si collum aliquid compatiatur, & præcordia retracta sint, aut anhelitus difficilis repētè superuenerit, thorace veluti intercluso. Si enim præter hæc pulsus in tumorem subito elati non reciderint in paruitatem, neque debiles fuerint, statim crīsis expectāda est. si verò nō mo-
do

dò non deciderint, sed etiã in altum attol-
lantur, & vehementiã assumpserint, faciem
iam ægrotantis inspicere oportet. Nam si
quod in eo membrũ agitatur, aut venæ que
sunt in tẽporibus pulsant aut malũ, vel na-
sus, vel oculus rubidior factus fuerit, magis
etiã crisis expectãda est. Si verò & inuiti la-
chrimati sint, aut splendores videre imagi-
nati fuerint, ac manus naribus admouerint
scalpẽtes, tũc nõ iam fluxurũ, sed iam fluen-
tem sanguinẽ inspicias. nã vbi semel aut bis
scalpserint, statim erũpit. Neq; verò ex his
per terrearis si hominem desipientem aut
resilientem inspexeris. Nam & hæc humo-
rum repentium ad partes superiores indi-
cia sunt: quemadmodum & anhelitus diffi-
cilis, & præcordia retracta, & collum simul
cum capite aggrauatum. At tibi vna cum
his indicio etiam sit desipiẽtia. Et hæc qui-
dem sufficere signa possunt. Sed accedit
quandoque & ægrotantis ætas, & natura,
quæ spem magis cõfirmat. ac præterea anni
tempus aërisque constitutio. Nam si ægro-
tus fuerit adolescens, aut alioquin natura
calidus, aut multo sanguine abundauerit,
magis adhuc de hoc sperandum erit. & si
etiã sapius antea dum sanus esset aut ægro-
taret, sanguis ex naribus fluere visus est,
hoc vel solum sufficit fluxus sanguinis spẽ
affe

afferre. Si verò & tempus anni æstas est, vel non est, sed tamen calidus præsens status, nonne ex his aliquam indicationē assume-
mus? Quod si & plures eo tempore crisin ex sanguinis fluxu habuerint, & hoc tibi spem vehementius augebit: & si corpus ple-
num extiterit, & consuetæ excretionēs fue-
rint retētæ. Mihi quidem neq; omnino vi-
detur difficile eū qui tot & talia habuerit
indicia, futuri sanguinis fluxus præcogno-
scere. At absurdum & magnæ imperitiæ est
non præcognoscere. Nostri verò temporis
medicorū negligētia ea admiratur, quæ ad-
miratione digna non sunt. Nā siue ex dex-
tra nare, siue ex sinistra fluxurus sit sanguis
nihil difficile ex nuper dictis agnoscere.
plures verò medicorum hoc non solum dif-
ficile, sed neq; omnino possibile existimāt.
& quidem has & alias excretionēs omnes
prænoscere licet. si hæc duo tantum consi-
derauerimus, & vnde naturæ motus aga-
tur, & in quam partem. Nā & quæ deficiūt
adiuvabimus, & quæ immoderatè ferūtur
coercebimus, si ista nouerimus. veluti con-
festim sanguinis fluxus ex splene magnæ cu-
cubitæ sinistris præcordiis suppositæ faci-
lè retrahunt. At qui ex hepate prodeunt,
dextris: & qui ab aliis membris, eadem ra-
tione. Nā ex vno de omnibus colligere po-
ter

† In Græc.
ἐμφύ.

teris in vniuersum contemplando. Quare
 & ego hoc in loco præsentem finiam ser-
 monem. deinceps autem de febribus quæ
 ex inflammationibus accidunt tibi transi-
 gam, deq; aliis passionibus quæ in singulis
 partibus corporis constituuntur. Inflamma-
 tiones quidem à veteribus dicebantur ve-
 luti quædam exandescentiæ: à iunioribus
 autem non æquè. Neq; enim herpetas, neq;
 erysipelata, neque tale aliquid quicquam
 inflammationibus annumerant. Sed vni tā-
 tum affectui ex calidis qui fit cum tumore
 duro atque dolore†phlegmonoso, hoc no-
 men accommodant. non tamen ad hunc so-
 lum febres sequi videmus, sed ad omnes
 simpliciter calidas ac veluti effluue-
 scentes passionibus. De his igitur,
 atque aliis similibus morbis, sequenti li-
 bro verba faci-
 ciemus.

†Mendose
 legitur in
 græ. cod.
 impressis
 φλεγμα-
 τώδους
 πυρρὰς
 γματὰ-
 δους. i. pul-
 satili, vt
 legitur in
 manuscri-
 ptis.



GALENI DE

ARTE CVRATIVA

AD GLAVCONEM

LIBER II.

NICOLAO LEONI-

ceno interprete.

CAP. I.



E his autem quæ in singulis corporis partibus fiunt passiones Glauco deinceps dicemus, ab inflammatione incipientes. Etenim sæpius hæc fit, plurimasq;

habet differentias, ex quibus omnibus solent febres contingere. Communis igitur in omnibus, immoderata caliditas & velut

† φλόγω- quædam † efferuescentia. vnde & * inflāma-
σις. tionis nomen de ipsis efferre antiqui con-

* φλεγμο- sueuerunt. Propriam autem quandam in
υἱς. singulis differentiam inuenies, ex qua eius

speciem agnosces, & conuenientem assequeris medelam. Aliter enim qui herpes, aliter quæ erysipelata, atque aliter quæ phy-

gethla vocantur, ac reliquas inflammatio-

nis

nis species curabis. Itaq; hoc etiam in loco
 antecedit ea facultas qua possumus rectè
 cognoscere passiones. Tibiq; hoc primùm
 conabor scribere, omnes ab initio distin-
 guens inflātionū differentias. Prima igitur
 inflāmatiōis differētia est secundū quā,
 hanc quidē humidam, hanc verò siccā esse
 contingit. Humidā quidē quæ ex calida flu-
 xione mēbrū occupante contingit. Siccam
 verò, quādo nullo humore influente calor
 naturalis efferuescit. Hoc autē vsq; ad ali-
 quid quidē veluti febris est membri: quum
 verò iam ad immoderatā caliditatē ac sic-
 citatem peruenerit, corruptio atque extin-
 ctio omnimoda fit. Quare neq; in plura se-
 cari potest, quēadmodum differentia alte-
 ra secundum quā quosdā influere humores
 particulæ dicebamus multæ enim sunt huius
 species. Nam fluente sanguine altera, flaua
 bile altera ambobusque simul humoribus,
 alia tertia. Et quidem in earū singulis vel
 iam putruit id quod influxit, aut in mēbro
 constrictū putrescit: & vel crassum est, vel
 tenue vel optimū seu acre. Sanguine igitur
 optimo ac mediocrē crassitudinē obtinē-
 re, ad particulā aliquā affatim fluente, atq;
 ob multitudinē conculcato vehemens do-
 lor arripit hominem, nisi mēbrū sensum
 omnino hebetē habuerit: pulsusque in pro-

E.

fundo molestus accidit, tendiq; omnino ac
 frangi membrum apparet, & vehementem
 calorem per sentit, adeo vt comburi videa-
 tur, & refrigerari desiderat. Talisq; rubor
 per summa viget, qualis ex balneis adue-
 nit, aut ex igne, aut quouis alio modo cale-
 factis. Hæc quidē passio totius generis no-
 men accipit, atque inflammatio nominatur:
 sicut multæ aliæ species nomen generis ac-
 ciunt. Fitq; semper ex omni ferè occasio-
 ne. Nam & vulneribus, & distentionibus,
 & disruptionibus, & contusionibus, & scis-
 sionibus, & exercitandi laboribus, & exar-
 ticationibus, atque fracturis, & spontaneis
 ulceribus aduenit. Et præter hæc omnia,
 quando ad immoderatam humorum reple-
 tionem venæ per tingunt, tunc quod super-
 fluum est, effundit ad aliquam partē quæ-
 cunq; eo tēpore recipere aptior sit. Omni-
 no autē, hæc reliquis omnibus est imbecil-
 lior, vel rarior, taut ad trahendum paratior,
 vel * ignobilior, ex quacunque causa fuerit
 ad has perducta dispositiones. Neque enim
 de hoc dicere proposuimus. Flava verò bi-
 lis quādo sui seruās naturā vnā cū sangui-
 ne per totum corpus defertur, morbum fa-
 cit qui * regius appellatur. Sola verò quan-
 do excernitur, & in aliquo mēbro cōsistit,
 herpes vocatur. Si quidē crassa sit secundū
 substan-

substantiam, totam exulcerat cutem vsque ad carnem suppositam. Atque hunc affectū Hippoc. nominat herpetem exedentem. Si verò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum veluti deurit, atque hæc species generis sortit appellatōe: quā simpliciter & sine additione herpes vocet. Nam ex duabus speciebus quæ quidem nuper dictæ sunt, altera herpes exedens nominatur, altera verò miliaris: quoniam in hoc affectu pustulæ parvæ ac multæ per summā cutem similes milio excitantur. Fit autem herpes huiusmodi etiam ex bile quidem, sed minus calida & acri quā sit prior. Quod si ex sanguine & flava bile calidiorib⁹ quā oporteat mixta fluxio fuerit, aut ex sanguine quidē, sed feruido ac substantia tenuissimo erysipelas hic affectus vocatur, multo inflāmatione calidior, magisq; colorē flauū repræsentans. Et si tetigeris, facilē sanguis subterfugit: rursusq; illabitur, exquisitē tenuis & aspectu rubidus: nō tamē dolet hic veluti inflāmatio, neq; vt aliqua inflāmationis species pulsū aut compressionem aut similem inuehit tensionem. Sed quandoq; valdē parum infestat, ac tum præsertim quando per solam cutem diffusum fuerit, nihil inferiorem carnē molestant. Et quidem tale sæpius accidit, atque hoc est ex-

ἔρματος
ἢ fluxiōc.

[non est
in græ.

quisitum erysipelas, quemadmodum quod attingit inferiorem carnē, id neque ex verē tenuibile consistit, neque tantum est erysipelas, sed iam dispositio permixta ex erysipelate atq; inflammatione. Exuperant autem in ipsa quandoque propria erysipelatis accidentia, atque hic affectus à iunioribus medicis erysipelas inflammationis participans nominatur. Nonnūquam verò inflammationis accidentia prævalent, & tunc ipsum nominant inflammationem erysipelatis participantem. Quod si neutrius accidentia manifestè obtinuerint, sed æqualia apparuerint: tunc erysipelas atque inflammatio misceri dicuntur. Exquisitum igitur erysipelas [tanquā] cutis solius passio est. non tamen ipsa inflammatio est partium tantum cuti subiectarum, sed harum quidem præcipuè, nonnūquam verò etiam cutis. & ipsa quidem dolorem non minorem affert quā altera, pulsus tamen ei deest. Quum verò sanguis influens calidus sufficienter extiterit & crassus, quodcūq; membrorum subitò occupauerit, hoc comburendo facit vlcus cum crusta, quicquid verò circumiacet in inflammationem eleuat effervescentem, & grauiter dolentem vocatur autē carbo huiuscemodi passio. Quum verò sanguis influens niger extiterit, crassusq;

susque, ac feculentus ac feruens, qualis quæ
 antea diximus, simul autē & † saniē quādā † *ἰχθυῶδες*
 tenuē admixtā habuerit, pustulas per sum-
 ma cutis excitat, similes iis quæ ex igne
 fiunt: quibus disruptis crustosum sub ipsis
 vlcus inuenitur. Etiā hoc carbo est. Inflā-
 matio quidē in tot species secundū ipsam
 passionis naturam diuiditur. Multas verò
 quispiā prætēmissas putaret deceptus mul-
 titudine nominū, veluti bubones, phyma-
 ta, phygethla, ophthalmias, peripneumōias,
 pleuritidas, & multa alia similibus appella-
 tionibus dicta: hæc enim omnia inflamma-
 tiones quædam sunt in prioribus compre-
 hensæ speciebus. Singula verò diuersa sunt
 sortita nomina: quoniam qui primi ea
 imposuerunt, vno nomine, & passionis
 ipsius, & continentis ipsam particulæ
 compositum intellectum interpretari vo-
 luerunt. Sunt enim bubon, phyma, atque
 phygethlon, partium laxarum (quas ade-
 nas vocant) passionēs: bubon quidem, in-
 flāmatio: phyma autem quod statim auge-
 tur atque ad suppurationē festinat. Phyge-
 thlō autē erysipelas particeps inflāmatiois,
 aut inflammatio erysipelatis particeps, no-
 minatur. Sic autē & ophthalmia, eius mem-
 branæ quæ corneæ inhæret, est inflamma-
 tio. Pleuritis autē, eius quæ lateribus sub-

†edevy-
709.

iacet. Synanchæ autē, + gutturis. Peripneumonia verò pulmonis: eademq; in singulis aliis ratione. Eas igitur quæ sunt in partibus apparentibus inflammationes, promptum est cognoscere. Quæ in occultis, & febres omnino afferunt, non æquè discernuntur. At mihi videtur mente egere perspicaci eiusmodi agnitio, ac præterea peritia naturæ membrorum, quam ex sectione simul & exquisita scientia operationumq; atq; usum cōparamus. De his quidē in aliis tractatibus diximus: nūc verò non datur de his sermonem adiungere, quando tibi repentē peregrinandi necessitas ingruat. Quo pacto verò quispiā eas maximè curat inflammationes quæ in apertis partibus cōstāt, hoc tibi primū transigo, principiū sumēs ab ea passione quæ plurimū fit, atque idcirco totius generis affert appellationem: in qua hoc imprimis considerandum existimo, quod & in aliis omnibus magnam vim habet ut morbi causam inueniamus.

De causis inflammationum.

CAP. II.

Est igitur una quædam apparentiū inflammationum causa, quæ non admodum occulta est, quæ fluxio appellatur, nisi quādoque illis cōiungatur, quæ aliqua alia ex causa evidente factæ videntur. Quādo enim

enim nulla ex his præcedente, mēbrū confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionē causa generat, fluxio vocatur, ipsa verò passio, dispositio fluxiōis. Oportetq; in his inflammationibus principia curationum optima fieri: nam quæ in ipsis errata contingunt, difficulter sanabiles aut omnino insanabiles faciunt dispositiones. Sunt autem hæc duo maximè errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur, et si calefiat atq; humectetur etiam membrū. Hæc verò duo medicorū pleriq; delinquant. Nonnulli quidē ex methodicis persuasi, & inflammationes omnes esse passiones astrictas existimantes, eas laxandas esse duxerunt. Sunt verò quidā qui sine ratione atque vlla consideratione istos sequuntur, vnā excusationem ad malè agendum habentes: nimirum cum multis delinquere. Sed neque ex dogmaticis medicis quispiam neque ex empiricis ita sensit. Sed quod & ratio & experientia suadet, totum quidem corpus euacuare quibuscunq; euacuationibus consulunt, ipsam verò inflammatam partem perfundere ac superlinire eis quæ id quod influit repellendi vim habent, id verò quod in membro patiente continetur euacuare: vim autem ac robur adiungere his quæ iam affectæ sunt

partibus. Ad quæ verò inspicientes oportet euacuare, iam & antea diximus: sed & nunc breuiter commemorabimus, ut insequentibus memoria seruata non sit necessarium in singulis passionibus, eas quæ euacuationes indicant audire intentiones. Aetatem igitur, & tempus anni, & re-
nem, & præsentem statum, & eius qui afficitur robur, habitumque; & consuetudinem, atque ipsam ægritudinis naturam, diximus considerandam. Ex his enim, quod vacuandum aut non vacuandum sit, & unde, & quomodo inuenitur: veluti in ea de qua nunc agitur dispositione, ad genus fluxus deferatur, atque hoc subito plurimum attollatur, tibi verò totum corpus plenum sanguine appareat & valida laborantis vis, tempus autem anni sit ver, regio temperata: æger verò sit adolescens aut iuuenis, is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus indiget: oportetque incidere eius in cubito venam, aut scilicet internam aut mediam. Si verò aliqua pars superior pateretur, per inferiora sanguis est educendus. Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit: atque emplastrum apponere ex semperuiuo, & corticibus malorum puniceorum in vino decoctis, & Rhu, & farina hordei compositum: hoc enim & in huiusmodi optimum est atque
ad

ad omnia quę facere intēdimus efficax. Repellit enim id quod influit: atque id quod continetur exiccat, & circūiacentia mēbra corroborat. Milleq; alia medicamina eodē modo cōponere licet, quorū cōpositionis viam ac modum in libris de medicaminibus didicisti. Vnde ego quoque in singulis vnū aliqd tibi subiiciā, futurū tibi & monumētū, & eius quę est in aliis facultatis exēplū. Si quidē non admodū doleāt, istis vtēdum est. Cum magno autem dolore fluxu incidente, non sic oportet neque aquā calidā, neq; oleū, neq; farinæ triticeæ cataplasmata offerre, hæc enim omnia fluxiōibus aduersantur, quamuis ab initio aliquid iuuare videātur. Sufficit aut in huiuscemodi affectibus vehementiā doloris mitigare cum aliquo ex his quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera quę in vtroque †Male le-
 sit liquefacta conficitur. Oportet autē hæc *gitur in* lanis excipere pinguibus, quę plurimum *Græ. im-*
 †cēsyphi habeant: & æstate quidem frigida, *pres. v-*
 hyeme autem tepida apponere. Sic etiam *σωνος* p
 cataplasmata ex arnoglossō, lente, pane, & *οἱ σωνος.*
 rosaceo oleo adhibere: paulō antē suprā *vide quę*
 patientes particulas apponere spongiā *vi- annotavi*
 no austero intinctā, aut aqua frigida. *Memus in li-*
 lius verò fuerit si parum aliquid aceti adiū- *bro 14.*
 gatur. Quod si hæc cura quidem insigniter *Meth. c. 7.*

*In anti. legitur. φαρμάκους μαλθακοῖς. i. medicamentis mol-
libus non

μαλτα- profuerit, neque alicubi pus se ostenderit
κοῖς ἐμ- *emplastris mollibus ad fluxionē vtēdum.

πλάσσοις. Optima verò ex his sunt quæ exiccandi &

*διελόν- repellendi quod fluit sine dolore vim ha-
τα- bent quemadmodum ea quæ vehementer

†In Græ. intendunt, atque idcirco dolorem afferūt,

ἐστ τῶν plus doloribus obsunt, quam exiccando

τ' ἄλλων proficiunt. Tale igitur oportet esse medi-

φαρμά- camen quale nobis in vsu est quod ex chal-

καρ τι cite cōstat, remissum oleo rosaceo. Si verò

τῶν ἐμ- lanam mundam vino acerbo madefeceris

πλάσσοις. & apposueris, pl^o iuueris. Quod si pus se in

i. aliq^d ex particula ostenderit, cataplasma offerre

his medica oportet semel aut bis. Plus verò ad præ-

mētis quæ sens iuuat farina hordeacea. Adiungēdum

ēplastica tamen & his aliquid vel aceti vel vini. Et

appellan- *postquam secueris & pus euacuaueris, ca-

tur: de qui uendum est deinceps ne oleum aut aquam

bis vide imponas: at si quando vulnus abluere oportet,

apud Gal. teat, mellicrato vel oxycrato & vino &

libro 4. de mulso vtendum. Superponendum verò, si

simp. med. adhuc inflammetur, ex lente cataplasma. Si

faculta. c. verò sine inflammatione fuerit, †aliquod

4. & 5. et ex his medicamentis quæ emplastri ritu

lib. 5. c. 10. applicantur, quibus in huiusmodi se-

ctionibus vti consueuimus, & praci-

puè id quod ex chalcite constat: apponen-

da

ταιπαινός τας habetur in græ. quod & pinguibus, & oleo-
 sis, verti
 da verò super hæc extrinsecus, spongia, poterat.
 aut lana vino acerbo persusa. Quòd si acer * In græ.
 bum non affuerit, tanto aceto aqua tempe est ἀποχά-
 randa est, ut adhuc potari possit, atq; hac ῥῆν, id est
 intingere oportet. Sunt verò & ad hoc op- in summa
 portuna, ea vina quæ aliquid aquæ marinæ cute scari
 recipiunt. Et tu quoque, ubi sit opportu- ficare, nec
 num, potes conficere permiscendo salem ei est quod
 vino quod penes te habes. Vulneri au- ubi hos tu
 tem, nullum ex medicamentis † quæ hu- mores ad
 mectant apponendum, quale est macedo- suppura-
 nicum, & quod tetrapharmacum nomina- tionem tē-
 tur. Nam exquisitè exiccare expedit. tamus du
 Ita quidem sanare oportet ex fluxione cere, eos
 inflammationes. Quæ verò alia ex causa incida-
 fiunt, humectare ac calefacere nihil pro- mus vide
 hibet. Et si ad suppurationem perducere Gal. in li.
 volueris, cataplasma ex farina triticea, quæ 13. Methi.
 in oleo atque aqua ebullierit apponen. cap. 3. &
 dum. Et si quādo * incidere oportuerit, ne- hic infra
 que hoc verendum est. Si verò eas quæ ex in cap. 7.
 fluxionibus fiunt inflammationes * secue. * ἀποχά-
 ris, magnū afferes malum, ac per initia præ- σαίς, id est
 fertim. Nam quæcunque ex ipsis longioris scarifica-
 temporis existētes, post totius corporis eua nervis
 cuationem, atque aliam opportunam cura-
 tionem, quasdam durities atque nigricies
 in

in mēbris habent derelictas, his sanguinem auferre nil prohibet, neq; enim amplius hæ in numero inflammationum habēdæ sunt, si cuti neq; erysipelatum, si quid iā liuidum sit. Etenim & hoc per initia quidē infrigidādum est, tūc præsertim quum sine manifesta occasione factū fuerit. Quando verò

† In græ. iam illi deerit feruor, & † incidere cōuenit, est *χάσας* atq; emplastrum ex farina hordeacea, * & *συμφεσι* ceratū & aliud aliquod medicamen ex di- id est sca- scutientibus apponendum, nō tamen ex verificare cō na in talibus sanguis necessariò mittendus ducit. est: sed ventrem tantummodo expurgare

* In græ. sufficit. dandū autē medicamen quod bilē additur flauam educat. Si verò passio parua fuerit, *ερεμω*, id neq; hoc facere est necessarium, sed sufficit est calida. clystere acri uti. Quæ verò ex vlcerebus sunt erysipelata, & quæcunque adeo manifestas causas habent, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si antea secueris, nihil nocebis.

† *πρωτο* Inflammationibus verò quæ cum erysi- *χάσας* le- late coniunctæ sunt & erysipelatis cum ingitur in flammatione, mixta quantum fieri potest, græ. i. an- curatio est adhibenda, semper que illi quod tea scarifi magis superat, resistendum. Et eorū quoq; caneris. quæ bubones, phymata, & phygethla à Græcis dicuntur, similem his quæ in aliis partibus similes accidunt dispositiones curatio

rationem oportet adhibere, præterquam in partibus quæ acriora medicamēta in eisdem affectibus possunt tolerare: quemadmodum sunt glandulæ, quas adenas vocāt. Herpetes autem, quantum ad totius corporis euacuationem attinet, vt erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulæ patientis locum, non omnibus similis cura adhibetur, nam qui exedētes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpes & erysipelata: non tamē ea ferunt medicamenta quæ præter id quod refrigerant etiam humectare natura apta sunt, sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maximè possunt exiccare. Non igitur lactucam, vel polygonum, neque ex stagnis lentem, aut palustrē lotum, vel anthyllion, vel psyllion, vel portulacam, vel serim, vel semperuiuū, vel tale aliquid quod refrigerare possit atque humectare, apponendum, quæ erysipelatibus erant opportuna. Neque vnquam spongiæ fidas frigida aqua perfusæ, neq; solano: quāuis refrigerandi atque vnā exiccandi vim habet, sed mediocrem, illi verò maiorem quā solano adsit, expetunt siccitatem. Superimponere igitur ipsis oportet, ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & arnoglossi. Post hæc verò
& len

¶ In vete- & lentem † adiungere oportet, & aliquan-
 ri græco do mel, & farinam hordeaceam, & quod
 codice le- antea scriptum ad inflammationes quæ
 gitur non ex fluxione eueniunt cataplasma, dempto
 μὴ γὰρ ab eo semper uiuo. Ipsa verò loca exulcera
 δὲ sed ta inunge medicamentis, quæ ad herpetas
 μὴ γὰρ in libris qui pharmaceutici dicuntur, scri-
 βι δὲ id pta sunt. Multa verò huiusmodi apud o-
 est erit ad mnes inueniuntur. plurimaq; ex his ad figu-
 miscenda ram paruorum circulorum formantur, &
 si oport- vbi uti volueris, ex vino dulci liquefacere
 teat. oportet. Quod si dulce non affuerit, tenui
 & albo & subaustero, quale est phalernū &
 massilioticum & sabinum & adrianū & ar-
 syinum, vtendum est. Cauendum tamen
 ne ob antiquitatem aliquam contraxerit in-
 gustu acritudinem, Et si posca aquosa vi-
 ce horum aliquando vsus fueris, nil dete-
 rius feceris. Iam verò in longum tempus
 protractis vlceribus, neq; dulci circuli par-
 uū sunt diluendi, neq; posca adhuc aquosa
 sit, & vina quæ sunt sufficienter austera cō-
 ueniunt, præcipuè verò nigra, & si ea non
 affuerint, alba. Medicamina autem in hoc
 tempore ipsis præcipuè sunt accommodata,
 & quod Polyidæ vocatur, & Pasionis &
 Musæ & Andronis, & quæcūq; alia his si-
 milia sunt. Herpetas verò qui summa tātū-
 modo exulcerant, nisi diu perdurauerint,
 nullo

nullo horum inungere oportet. † adurunt † *In anti.*
 enim fortiter & vehemēter exiccant. Verū *legitur nō*
 istis sufficiunt quæcunq; vim glaucij habēt *καὶ ἡ γὰρ*
 medicamenta, diluere autem maximè qui- *ἰκνυρῶς*
 dem aqua. Quòd si nil profecerit, etiā ace- *sed ἡ*
 tum adiungere oportet. Quòd si etiā sola- *γὰρ ἰσ-*
 ni succo intinxis aut arnoglossi, plus etiā *χυρὰ, ἰδ*
 proficies. Summatim verò hæc te cognosce *est fortia.*
 re oportet. quod omne vlcus siue spōte si- *n. sunt.*
 ue ex casu siue ex percussione factū fuerit, † *μη περι-*
 exiccari desiderat medicamento (vt inquit *σκελῆ.*

Hippocrates) † non aspero, hoc est nō mor-
 dēte neq; vehementer irritante, præter quā
 vbi malignū & cū putrilagine fuerit. Talia
 enim acriora expetunt medicamina, & quæ
 ignis vires habent. quale est misy, & chalci-
 tes, & arsenicū, & calx, & sandaracha. Et
 enim nō aliter quā ignis adurūt medicamē-
 ta huiuscemodi. Sæpius verò vbi ista cesse-
 rint, ipsum ignem adhibemus. Eadem
 ratione, vocatis carbonibus, super ipsam
 crustam, vbi præcipuè membrum putre-
 sit, huiuscemodi medicamentorum est † *In græ.*
 natura conueniens, non tamē loca circum- *est λύοις*
 iacentia tangere expedit, † ne te ipsum la- *γὰρ αὐτὸ.*
 teat, ea exulcerans quæ minimè expedit, id est si
 sed antedictis circulis paruis vtēdū est, qua *quidē di-*
 lis est qui andronius nominatur. Si quando *solues il-*
 verò rubor inualuerit, & plurima inflam- *la.*

matio,

matio, medicamentum dulci est diluendū,
 vel arnoglossi succo. Si verò magnus sit
 tumor, vino quidem acerbo in principio,
 postmodum verò & aceto. Cataplasma
 etiam ex orobi farina & oxymelle confe-
 ctum apponendum, atque antè hæc omnia
 statim ab initio tantum sanguinis auferen-
 dum quantū sufficit, nisi aliud prohibuerit.
 Hæc quidem sunt passionum per genera cu-
 rationes, quæ pro naturæ instrumentorum
 patientium varietate mutantur. Quatuor
 verò sunt ab his indicationes, ab eorum tē-
 peratura, à formatione, à situ, atque poten-
 tia. A temperatura, si nonnulla quidam ex
 ipsis natura sicciora sunt, nonnulla autem
 humidiora, quædam frigidiora, quædā ca-
 lidiora existunt, & secundum coniugatio-
 nem humidiora ac calidiora, † vel sicciora
 atq; frigidiora, aut ex toto tēperata. Opor-
 tetque in curationibus intentionē haberi
 ad membri naturam. Hæc enim quousque
 infrigidandum aut exiccandum sit docet.
 Nam si carnosæ partes inflammationē pa-
 tiuntur, paulum exiccandæ sunt, venosæ
 quoque quanuis sint carnosæ longè siccio-
 res, non tamen & ipsæ multum exiccari de-
 siderant. Sed quæcunque natura arteriosæ
 sunt, magis venosæ sunt exiccandæ, atq; his
 amplius, nervosæ, & multo magis cartila-
 gino.

† *ἐκ τῆς
 οὐκ ἀπε-
 ρος: id est
 à partis
 facultate.
 † additur
 in græ.
 vel humi-
 diora &
 frigidio-
 ra, vel sic-
 ciora &
 calidiora.*

ginosæ & ossæ. Nam prius quam ad propriam naturam particula redeat, nondû curationi impositum finem arbitrandum. Sicciorem verò temperaturam inducunt quæ siccissima sunt: & frigidiorē, quæ frigidissima, & secundum alias qualitates eodem modo. Ad mediocrem verò habitum referunt, quæ sunt in vnaquaque mediocria. Sic quidem partium temperaturæ passionum variât curationes. At formationes hoc modo. Nam quædam intra sese habent cavitates, quædam extrinsecus, quædam vtrobi- que, quædam neutra parte, velut ex simplicibus, arteriæ, ac venæ, & nerui: quæ quidē in artubus sunt, intra sese: quæ verò intra peritonæum, vtrinque. Nerui autem qui in artubus sunt, neutra parte, qui verò intra peritonæum, ex altera, visceribus autē ferre omnibus, intrinsecus atque extrinsecus sunt magnæ capacitates, ac præterea caro ipsa in pulmone quidem spongiosa, contra verò in trenibus densissima, & post hæc, hepatis caro. Splenis verò caro, quanto densior est ea quæ in pulmone, tanto illa quæ in hepate rarior. In omnibus igitur his quæ neutra ex parte cavitates & receptacula habent, defluxionis superfluitatē recipiētes fortiter exiccare oportet, & si nō fuerint natura sicciore, sicuti nerui, & præ-

†male le-
gitur in
impres.
¶¶¶¶¶
pro ve-
¶¶¶¶¶

F

† In græ. cipuè† in membris supradictis. Sed quæ sit.
 est τὰ ἐν- tus & extra aliquid inflammatiois possunt
 τοῖς κώ- relaxare, non multū huiusmodi fortiter
 λοις, id est exiccantibus egent, si præsertim laxā carnē
 illi q̄ sunt habuerint, quæ admodū pulmo. At ex posi-
 in artub⁹ tu indicatio, neq; ipsa prætermittenda est.
 † ἡ ἀντι Nā per quæ euacuare oporteat, atq; quo-
 σπασις. modo, ipsa demonstrat. Fluentiuū igitur ad-
 † ἡ πρεα huc humorū, † retractio (sic enim Hippo-
 χρίτεσις. crates nominat) eorum aut qui iam mēbrū
 * ταῖς ἐν obsederūt† deriuatio medela est. Vtrunq;
 ἡγνύσις, in autē euacuationis genus, per cōmunes ve-
 græ. habe- nas fieri præcipit, veluti eas quæ in matrici
 tur, quod bus, in cōtrarium trahes, si eā quæ in cubi-
 vertēdum to est secueris venā, aut mamillis cucurbi-
 erat, eis eas apposueris, vel manus cōcalefeceris &
 quæ in po fricueris atq; alligaueris. Deriuabis autē si
 plitibus. * eas quæ in genibus, aut talis venas diuise
 † τὸ κατ' ris, & cucurbitulas coxis applicueris, & cru-
 ῖ σότυτα ra calefeceris ac perfricueris atq; alligauē-
 habet in ris, & si quidē in parte dextra matricis pas-
 græ. quod sio fuerit, à dextra manu aut crure detraxe
 secundum ris sanguinem, si verò in sinistra, à membris
 equalita- quæ illi edirecto sunt. Quòdenim ab ipso
 tent verti κατ' ἐν dicitur, hoc ipsum est † secundum
 posset. rectitudinem. Interiores autem venas, inci-
 * τὸ ἐν- dere oportet. * hæ enim viciniore, magis-
 πορεάσις quæ è directo sunt, patiētibus mēbris. Nam
 quo! est si si lene inflāmationem patiente sanguinē
 via

vis euacuare, interiores in manu sinistra *in impres-*
 venas secato, et si hepate, eadem ratione in *abundat.*
 dextra. Siquid verò ex superioribus in *in legendum*
 mationem habuerit veluti in his affectibus *autē erat*
 quos Græci synanchas, & ophthalmias vo. *in initio*
 cant, & quicunque alij capiti aduenerint, *linea vbi*
 eas quæ ex t. infecus sunt atque à directo. Si est *ἐπ' αὐ*
 autem artus patiantur, † à coniunctis eua- *τὸ.*
 cuatio faciēda, siue retrahere velis, siue de- *† ἀπὸ τῶν*
 riuare. præterquam vbi passio sit inuetera- *δμοζύγας*
 ta, tunc enim à membro ipso patiente de- *† ἀποχά-*
 trahimus. Sic igitur in synanchicis affecti- *ζομεν est*
 bus eas quæ sub lingua sunt venas incidi- *in grac.*
 mus, vbi iam totum corpus vacuum se no- *id est sca-*
 bis obtulerit, passio verò sit diuturna: sic *rificamus.*
 & hepati & speni cucurbitulas applica-
 mus. Sic & aliud quodlibet patiens mem-
 brum † incidimus, si non amplius humo-
 res influant (tunc enim magis irritaueris,
 ac, malum duplicaueris) sed quando iam
 totum corpus expurgatum fuerit, neque
 iam aliquid influit, aliquid verò quod
 pridem influxerat, in membro contine-
 tur. Et quidem laborantibus conuexis he-
 patis partibus quod per vrinam trahere
 oporteat, concavis autem, per excretionem
 inferiorē, situs ipsæ visceris indicat. Atque
 etiā thoracem & pulmonem per tusses ex-
 purgare. Ventriculum autē & stomachum

per vomitus. Intestina autem per inferiores excretiones, quemadmodum & splenē & renes per vrinas, matricem autem per menstrua, cerebrum autē atque eius membranas, per palatum & gargareonē, & nares, & aures. Sed quod & his quæ in superficie sunt partibus talia medicamēta apponere oporteat qualibus eget passio: atque iis quæ in profundo sunt, & quas per multa interposita debent eorum virtutes attingere: non qualia nunc sint, sed qualia futura sint, ex situ membrorum agnoscimus. Quare siue medicamētum est ex his quæ extrinsecus apponuntur, siue ex his quæ comeduntur, aut bibuntur, non præsens eius vis considerata est, sed ea quæ ad membrum affectum sit peruentura, hæc igitur quæcunq; in pulmonis inflammationibus, extrinsecus thoraci applicantur medicamenta, multo fortiora atque acriora natura sunt quàm si ipsa membro patienti apponerētur, quod enim per multorum corporum media ad membrum patiens peruenit, omnino exolutum est: & viribus defecit, si ab initio fuerit imbecille. Tantum igitur aduentitij roboris adiungere oportet, quantū in transitu amittitur, vt quod relinquitur, æquale remaneat ei quod tactu iuuat. Ob id igitur in thoracis inflammationibus quæ in superficie

ficie consistunt, ea quæ solū laxare possunt
sufficiunt, intrinsecus autem, sicut in mem-
brana succingente, acriora sunt necessaria.
Et de splene etiā atq; hepate omnibusque
visceribus intrinsecis ratio eadem. Sapius
enim ex, medicamētis impositis vlceratur
cutis, quanuis durior minusque ad patien-
dum habilis quam viscera. Et si ipsis visceri-
bus medicamenta applicare possemus, qui-
bus frequenter indigent, tātō molliora es-
se oporteret, quanto & ipforum natura fa-
ciliior affici. Et quidem omnia quæ comede-
re & bibere iubent medicamenta viscerum
passionibus conferentia, hæc multo acrio-
ra ac potentiora viribus esse cōuenit, quā
hæc quibus indigent membra morbis affe-
cta, exceptis illis quæ & ventriculo & sto-
macho auxiliātur. Hæc enim sola talia ex-
hibentur, qualia à passionibus exiguntur.
Reliqua verò omnia, acriora ac fortiora
sunt, & præsertim quæ vel renum vel pul-
monis occasione dantur. Cōsidera itaque
quot numero partes pertrāsire oportet id
medicamē quod ad pulmonē sit peruēturū:
primū quidē, os, & fauces, & stomachum:
deinde & ipsum ventriculum, & quædam
ex tenuioribus intestinis, deinde eas quæ
sunt in mesenterio venas: deinde eas quæ
in finis partibus hepatis, ex quibus ad eas

quæ in conuexis transumptum. hinc ad
concauam peruenit venam: post quam ad
cor: deinceps hoc modo ad pulmonem. Ne-
que negare possumus quin in singulis par-
tibus his, quibusdam admisceatur humori-
bus, ac quandam transmutationem atque
alterationem pro natura visceris capiat.
Quare quod de eius virtute relinquitur,
minus omnino est, atque imbecillius quàm
vt membrum affectum iuuare possit. Quæ
igitur à situ partium indicatio sumitur in
tantum curationem euariat: quæ verò à
virtute quantum nunc dicturus sum. Quo-
niam ex partibus corporis nonnullæ ab in-
fluentibus virtutibus gubernantur, quæ dā
verò à propriis atque natiuis: atque ex his
ipsis, quædam sibiipsis duntaxat, quædam
etiam aliis fons & origo sunt virtutum: &
aliæ quidem opus habent peculiare, aliæ
autem commune: permutare opus est cura-
tionis formam pro ratione earum, quas di-
ximus, differentiarum. Nam pleraque ex
his remediis quæ antea memorauimus, mor-
bum quidem finiunt: sed natiuas membro-
rum virtutes offendunt. quæ quidem offen-
sio ad totum peruenit corpus. quod dupli-
citer fit, quatenus & membrum est alicuius
virtutis origo omnibus partibus commu-
nicata, aut ipsius opus toti corpori vtile
est.

est. Hepar enim, cor, cerebrum & testes, cōmuniter vniuerso corpori principia sunt virtutum. Ventriculo quidē atque matrici propriae insunt virtutes nulli alteri parti communes. Opus verò ventris quidem toti corpori confert, matricis autem nequaquam. Nocet autem sapius passionis curatio membri patientis virtuti Quæ enim immoderata laxant, soluunt robur: quare & membri virtutem. Quæ autem supra modum refrigerant, natium calorem extinguunt, qui fortassis (vt nōnulli arbitrantur philosophi ac medici summi) substantia virtutum existit. Et si non hoc, saltem primū & maximè necessarium ipsorum instrumentum. Iam verò & qualitates quadā extraneæ, virtutes dissoluere possunt. Nihil igitur horum in curationibus præterire oportet, ne nosmetipsos fallamus in eum incidentes sermonem: Morbus quidem curatus est, homo autem obiit, quod à quamplurimis quotidie facitari vides, qui irrationalem experientiam profitentur, atq; heresim methodicam, omnia artis bona destruunt, aut sermones aliquos dogmaticos quidem, sed multis erroribus plenos consecrantur. In indicatione autem quæ habetur ex virtute partium, quispiam etiam reponeret & facilitatem & difficultatē ad

sentiendum. Nam quæ facilè sentiunt, acris
 medicamenta non tolerant, sicuti neq; etiã
 humores. nam quum acris humor in ventri-
 culi ore continetur, sæpius animi defectum
 patiuntur. Quod si mediocris sit affectus,
 anxietatem & nauseam habet. nonnunquã
 humorem quo infestantur euomunt, non-
 nunquam verò frustra agitantur. Hocq; in
 illis affectibus accidit, in quibus in ore ven-
 triculi vitiatus humor imbibitur. eodẽ pa-
 riter modo, quum ad oculos huiusmodi hu-
 mor defluerit, maximum affert dolorẽ: &
 pustulas vlcerosas, & quæ difficulter curã
 recipiunt, excitat. Sic quoque rursus, oculi
 ipsi ob eam quam habent ad patiendum fa-
 cilitatem, tolerare non possunt acrium me-
 dicamentorũ commercium. quemadmodũ
 neque etiam ventriculi os: neque etiam ali-
 quod extrinsecus aggrauans hæ particulæ
 tolerant: & magis ventriculo oculus, qui
 nonnunquã etiam ab his quæ inũgũtur ¶ mo-
 lestatur. At quæ sensum obtusum habent,
 grauatur. hæc cataplasmata grauiã sustinent & medi-
 camenta mordacia. Si quis igitur velit ex
 facilitate sentiendi indicationẽ illis quatuor
 quas antea memorauimus, quintam annu-
 merare, vel in ea comprehendere quæ ex
 virtute sumitur, nihil quãtum ad rectẽ me-
 dicandum differt. Has igitur omnes indi-
 cat

† διὰ τὴν
 ἐν ὀφθαλμῷ
 εἶναι.

† βαρύνει-
 ται. i. ag-
 grauatur.

cationes memoria habere oportet in quacun-
que particula morbo aliquo affecta. nā
& ipsius temperatura & formatio, & situs,
& virtutes, eas quę in nobis fiunt operatio-
nes commutant, communi intentione ser-
uata: quam quidem ex morbo semper assu-
mendam esse docuimus. Qui igitur secun-
dum solam & simplicem intemperiem mor-
bi fiunt, per contrarias qualitates curantur.
Calida quidem intemperies, per refrigeran-
tia: siue primo siue ex accidenti refrigerēt.
frigida verò per calefacientia: sic sicca per
humectantia, humida autem per exiccātia.
De eo verò quod primo calefacit aut ex
accidenti, plenè (vt nosti) diximus in eo tra-
ctatu quem de simplicium medicamentorū
potestate composuimus. vbi id quod pri-
mò frigidum est, quandoque ex accidenti
calefacere ostendimus: quemadmodū aque
frigida infusionem, vbi caloris naturalis fe-
cerit reuocationem, & calidum refrigera-
re, quum rarefaciendo corpus, caliditatem
fecerit euaporare. Quę igitur secundum
solas actiuas qualitates corporis sunt alte-
rationes, ex sola quę ex calefacientibus,
refrigerantibus, humectantibus, atque exic-
cantibus potestate adhibetur, ad naturalē
habitum restituuntur, neque sensibili egēt
euacuatione. Quę verò ob materię influ-

xum si quidem bene temperata fuerint, solam euacuationem desiderant. Si verò vitata, euacuationem, atque vnaper contrarias qualitates expetunt alterationē. vacuationis quidem veluti qui reumatici dicuntur affectus. de quibus (vt nosti) vnum à nobis volumen est æditum, in quo & hoc statim ab initio ostensum est, quòd ea quæ totum corpus alit facultate laborante, huiusmodi sunt dispositiones, quum aceruata superfluitas ad partes præcipuè defluat imbecilles. Si enim per reumaticam dispositionem sanguis qui in huiusmodi partes fluat fuerit vitiosus, mixta oritur dispositio: quod fortè rarissimè euenit. Sanguis enim sine pituita aut flaua vel atra bile fluens, tenuis substantiæ mihi semper apparuit. Ex alia autem quapiam causa si pars intumeat, considerandum est an huiusmodi affectus sit inflammatio, an scirrhus, an œdema. Nos enim omnem calidam ac veluti flammeam dispositionem nominamus inflammationem, cuius differentias paulò ante diximus. Tempus itaque est vt de œdemate quam breuissimè moneamus, vt memineris eorum quæ per digressionem nos dicere audiuiisti.

De œdemate.

Cap. III.

Oede

OEdema autem vocamus tumorem mollem doloris expertem, quem ex pituitosa substantia aut spiritu vaporoso fieri constat, qualis in cadaueribus euenit. Nonnunquam etiam in pedibus & cruribus eorum quos aqua inter cutem vexat, & in tabidis & aliis qui malo habitu (Græci κατὰ τὴν οὐρίαν vocant) laborant. Verum tale oedema in periculosis illis dispositionibus accidens est, nulla propria præcipuaque curatione indigens. Sola enim frictio ex oxyrhodino aut nonnunquam ex sale & oleo, vel etiam ex sale iniectis oxyrhodino, sufficit ipsum, aliaque huiusmodi multa. quum verò propter pituitam parti influxam huiusmodi sit affectus, spongia in aqua quæ parum aceti habuerit rigata, passionem sedat. Si verò non quieuerit, paulo plus aceti miscendum est. Si tamen moderata ipsius temperatura, ut possit ipsam quispiam bibere. Quæ autem plus aquæ quam hac continet, in principio adhibenda est, maximè laxis corporibus. quæ verò fortior fuerit, virilibus corporibus & duram habentibus pellem, & quæ ad primam spongiæ appositionem non iuuantur. Oportet autem spongiam omnino nouam esse, quæ si non affuerit, saltem exquisitè abluta sit.

fit aphronitro & nitro, & lixiuio. Quod si ex his œdema nō quiescat, aluminis parum imponendū est, spōgiaq; omnino noua applicetur. Si verò in aliquo artuum tale fuerit œdema, incipiendo ligaturā in imis partibus, finire oportet in altioribus: iniectionem & compressionem & vniuersam distributionem facientes velut in fractionibus. Curationis enim intentio in huiusmodi affectibus mixta est vna quidē vt eorū substantia dissoluatur, alia ad aliquid congregandum & restringendum. Si igitur per ea quæ dicta sunt non sedetur, tūc aliquid fortiorum medicamentorum, quod temperaturam admixtam habeat ex dictis potestatibus adiiciendū est. Ego in diuturno œdema vbi partem oleo illinissem, spongiāq; ex lixiuio apposuissem, atque vehementius strinxissem, affectum perfectē curatum vidi, etiam hac viuendi regula non habente mixtam virium contemplationem, sed ad discutiendum & incidendum declinante, id quod in omnibus ferē diuturnis affectibus probatum haberi non ignoramus. Postquā verò satis ad te de œdematis scripsimus de duris deinceps tumoribus dicendum est.

De scirrho.

Cap. IIII.

EXquisitus scirrhus, est tumor præter naturam insensatus durusq;. Non ex-
qui

quisitus verò, non omnino insensibilis est,
 difficulter tamen omnino sentitur. Scir-
 rhus igitur insensibilis curam non recipit.
 Qui verò difficulter sentitur, nec incurabi-
 lis est, nec facilem curationem admittit. Fit
 autem ex humore lento & crasso vix solu-
 biliter induratis partibus infixio. Interdum
 itaque statim à principio congregatur pau-
 latim & augetur. Crebrius verò medicorū
 imperitia paratur, cum vehementer erysi-
 pelata & inflammationes astringunt & in-
 frigidant. Si quis igitur medicamenta ve-
 hemēter dissolutiua induratis corporibus
 adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrho
 diminutionem, breui tempore nō verè spe-
 rauerit perfectam curationem, nempe igno-
 rans quod residuum passionis hoc curatio-
 nis modo incurabile redditur. tenuiorie-
 nim e: dissoluto humore, residuū exic-
 catum lapidis duritiem consequitur. Non
 igitur curandæ sunt partes induratæ medi-
 camento immodicè siccāte, sed cū eo quod
 calorem habeat tepidum, humiditatem ve-
 rò nec multam, nec omnino minimā. quod
 enim superfluum humorem habet, nihil o-
 mnino dissoluit. quod verò minimum, plus
 quàm oportet exiccat. Oportet autem in-
 duratum corpus à medicamento quod au-
 xilium futurum sit, simile quid pati his quæ
 sub

sub sole funduntur. Vocantur autem mol-
 lificantia huiusmodi medicamenta: de qui-
 bus amplius diximus in quinto tractatu li-
 bri, qui de simplicium medicamentorum vi-
 ribus inscribitur. Exempla quoque (vt di-
 ctum est) ex simplicibus sunt omnes medul-
 lae atque adipēs. Ex medullis primas partes
 obtinet ceruina, deinde vitulina. Ex adipi-
 bus autem adeps anseris, in volucrium: leo-
 nis verò, in pedestrium animalium genere
 ceteris praestat. qui verò ex gallina sumi-
 tur, anserinum, & qui ex pardo, leoninū se-
 quitur, ac denique vrsinum atque taurinū.
 qui verò ex capris accipitur, & crassior &
 siccior praedictis est, idque magis si ab hir-
 eo capiatur. At iam dictum est quòd huius-
 modi affectus medicamentis vehementer
 siccantibus non indiget. De differentia ve-
 rò quæ ex eorum tenuitate crassitudineq;
 oritur, & indicatiuè quidem dictum est: ma-
 nifestè verò nequaquam adhuc. Idcirco in
 memoriam tibi reuocanda sunt quæ inuicè
 cōmentabamur, quomodo Cercylii pue-
 rulum curabam, cui ex erysipelate nimis in-
 frigidato atque astricto, tumor durus in to-
 to femore relquebatur. Existimauimus e-
 nim medicamenta quæ ipsum curare debe-
 rēt, tenuia esse oportere. quare femur oleo
 fouebā, in profundā peluim posito puero,
 quæ

† in δ & κ τ ι -
 x α s .

quæ multū Sabini olei continebat, eo quod
 omnium tenuissimum ipsum esse sciebam.
 Balneo verò nisi pluribus interiectis die-
 bus, curandi totius corporis gratia prohi-
 bebam. Postquā verò partem fouimus, me-
 dicamenta ex prædictis medullis & adipi-
 bus confecta adhibuimus, miscēdo nonnun-
 quā bdellium scythiū, masticem ægy-
 ptiam, atque ammoniacum thymiana vo-
 catum, quod pingue & non vetustum esset,
 similiter & chalbanū. Et postquā per hæc
 præparatum fuerat, soluto ammoniaco pin-
 guissimo in acerrimo aceto, circūlinito tū
 femur. Deinde per aliquot dies rursus opo-
 panacem multæ pinguedinis miscui aceto
 acerrimo, & huius videlicet exoluens id
 quod recēs erat. alioquin pingue nō perma-
 neret, quemadmodum nec bdelliū, nec am-
 moniacum neq; etiā chalbanū. Insiq; pue. † ἀσκολιδ
 rum in altero crure stare, vt plus cibi ad il-
 lud ferretur. Rursus vt resederat iam tu- ludus pue
 mor scirrhusus, timēs ne eius residuum ma-
 rorū, quā- neret, omnia econtrariō facere aggressus do vni in-
 sum, femur * ex resinaceo aliquo medicamē nitētes pe
 to perūgēs. Manifesto itaq; clarebat quod di saltāt.
 ex aceto linimenta egregiē tumorē commi * τινὶ τῶν
 nuerāt: laxatiua autē molliorē reddiderūt, πικρῶ
 minorē autē nequaquā. vicissim tamen eis τῶν φαρ-
 vtēdo, adhibito conuenienti moderamine, μακρῶ
 pue

* ἀπνευρώσεις. i. nervosus musculorum propagines.

† διακινεῖν. i. permovere.

* Ita legitur in græ. cod. impf. & manuscriptis πολλὰ γὰρ
 ἡ διὰ τῆς τελείας ἡ γυμνασμένη τε καὶ κεκυλωμένη διὰ τὸ τοῦ
 τοῦ τρέπου τῆς θεραπείας, ἢ αὐτῇ τῇ διακινεῖν ἡ θεραπείῃ
 τελείας. i.

multæ e- puerulum curavi: sicut si altero duntaxat
 nim ptes medicamentorū genere quis curam attētas
 iam planè set, nihil ad scirrhi solutionē profecisset. In
 curuata, tēdonibus verò (voco autē sic *eneruatio-
 & mutila ues musculorū) ex prædictorū medicamen-
 te hoc mo torū vfu manifestissima auxilia videri licet,
 do curatio si quis rectè vtatur curatiōe ex pyrite lapi-
 nis, in ipsa de. Atq; oportet eū quū igne excanduerit,
 mēbri per acerrimo aceto aspergere, ac deinde super
 motiōe ita lapidem† mouere partem affectam, vt à va-
 pfectè cu- pore sursum lato scirrhus dissoluatur.

rata sunt. * Multi enim hoc modo curationis perfe-
 In aliis co ctè sanati sunt, vt ferè magicum opus vi-
 dicibus le deretur. At oportet præparare mollificādo
 gitur non partem indurata, medicamētis de quibus
 κεκυλω- suprā diximus. Etiamnum in hac ipsa quæ
 μενδ, sed fit per pyritem lapidem curatione, subinde
 κεκυλω- multum oleum* Sabinum prius perfunden-
 μενδ. i. cō.

uolutæ. Quo pacto autem ex scirrho artus occupante mēbra
 incurua fiant, illi norunt qui alias etiam subinde vident
 egritudines.

* In impres. additur θερμῶν. i. calidū, sed in ant. nō habetur.
 dum

dum est, aut aliud quod extenuandi vim habeat. Nec minus proderit anethi comā decoquere, præsertim quū viridis fuerit atque recens. Quod si pyritem habere non possis, molari vtendum est. Vocant autem sic lapidem ex quo molæ parantur quæ frumentum molunt.

De splene indurato. CAP. V.

Splenē induratū non solū de foris fortibus medicamentis curare conuenit, sed & fortissimis potionibus: nam eas sine molestia tolerat. Ex quorū numero primas partes sibi vēdicant cortices radicum capparis, & scolopendrij, & myricæ, tum radix, tum germina omnibus huiusmodi in aceto & oxymelite coctis. At sæpenumero quū tangitur splen resistere videtur: non tamē ^{τοκιστὸς} durus, sed flatuosus potius est tumor, in quo ^{δυσ.} oportet absynthio quum prius madefeceris ^{* ἀλλὰ καὶ καὶ} medicamen emplasticum mixtas vires con- ^{τῶ ποσῶ} tinens superponere, quale est quod ex sulfure atque alumine constat. Sunt denique ^{τῆς μι-} multa huiusmodi in medicamentorum tra- ^{ξως id est} ctatibus descripta. Non simpliciter autem ^{sed ex} mixtorum medicamentorum viribus attē- ^{quātitati} dendum est, ^{* eorum ex} sed & quantū miscetur. Quū ^{quibus mi} itaque splen flatuoso tumore afficitur, vel ^{xtio con-} magis cedemate, si multum aluminis adhi- ^{stat.}

*In Gra. bueris, nihil nocebis. *in duris autē tumori
 legitur in bus vim †dissolutiuam superare conuenit:
 indurato parum autem eius quod stringendi vim ha
 aut liene. bet admiscendum est. Quum igitur de nu-
 †διαφο. mero simplicium & sponte nascentiū medi
 φντικόν. camentorum flos salis tali sit natura prædi-
 i discutie tus sanat splenes induratos si extrinsecus
 tem. ipsis in vesica apponatur. Scirrhum autē he-
 *In im- patis ab initio quidem sanauimus sæpius,
 pres. est ubi verò ad plures dies fortè foret exten-
 is ἀπ' αὐ- sus, neque ipse potui sanare, neque aliū vidi
 τος, id est qui posset. Omnibus igitur qui ita affecti
 omnino. lo sunt *ex necessitate subsequitur aqua in-
 cus aut nō tercutem pereunt autem quāplurimi in tē-
 videtur pore longo. Quosdam verò noui etiā bre-
 corruptus ui periisse qui magno ventris profluuiō la-
 ut nota- borabant. Liquet igitur quod his sufficien-
 tur in Al- ter *compressa erant ora vasorum per quæ
 dino. transmittitur cibus ex finis hepatis parti-
 *ιστιγ- bus in conuexas: adeo quod si quis ex eis sa-
 vore. nati sunt ea quam antea diximus in muscu-
 losarum partium scirrhis, curationis ratio
 seruauit. Neque enim perfert hoc mēbrum
 fortia medicamenta, veluti splen. Augere
 autem oportet ea quæ ratione inflāmatio-
 nis illius apponuntur in mixtura emollien-
 tium. Erant autem illa ex absinthij coma,
 & expressione myrobalani, & vtraq; nardo
 indica ac celtica. Adhuc autem & croco

&

In imp̃s. malè legitur ἐμπεδάσαι, pro ἐκπεδάσαι, sed in ant. est ἐκπῶα.

& cœnanthe, & mastiche chia, & vnguentis *πάσαι. i.*
 quæ ex spica nardi conficiuntur. Adhuc au- *ad dissipa-*
 tem mastichino & melino & cœnathino. His *pandum.*
 igitur ammoniacum thymiana, & bdelliū ** In imp̃s.*
 & quas diximus medullæ, & adipēs mixti, *leg. δια-*
 & quæ incidere possunt, factum in hepate *ἐπιτάσαι, in*
 scirrhum sanare poterunt: etiam ratio con- *anti. δια-*
 ueniens victus adhibeatur vna cum medi- *ἐπιτάσαι. i.*
 camentis quæ in potu sumuntur, ad t̃ape- *dissoluen-*
 riendum* abstergendumque eum qui in vi- *dū, in alio*
 scere continetur humorem. Sunt verò hæc *verò vetu-*
 omnia etiam eos qui in renibus continetur *stiore cod.*
 lapides comminuere apta: de quorum mate *legitur*
 ria multi medici conscripserunt. Admisce- *διακροσῆ-*
 re autem oportet & ex his quæ vrinam mo- *σαι. i. dis-*
 uere possunt aliquid. Plurima verò est etiā *cutiendum.*
 istorum materia quæ à multis quidem scri- ** In imp̃s.*
 pta est, atque à nobis comprehensa in eo *est αἰθε-*
 quem de medicamentis scripsimus tracta- *εἶδος in*
 tu. Quare nunc etiam quæ dicta sunt tibi *ant. ἀερω-*
 sufficiant. Tempus enim est transgredi ad *δης, id est*
 alterum tumoris genus, cui materia gene- *aërens.*
 rationis est spiritus flatuosus. Vocatur au-
 tem non solum flatuosus, sed etiam flatus
 huiuscemodi spiritus, crassus & vaporosus
 existens non secundum substantiam * æthe-

† In impres. habetur συμβάλλεται in ant. συμβαλῶν.

* διαπνέσθαι. i. defletur.

† male legitur in impres.

* περιτοναίσις, pro περιστασίσι.

* ita legi-

tur in græ reus neque tenuis. Cogita verò eius natu-
cis compre ram ex circūstāte nos aëre, in memoriā re-
hēditur uocans qualis in austrinis flatibus, qualis ve-
rò ali- in aquilonaribus: austrino enim aëri similis
quādo in- est flatus spiritus: aquilonio aut is qui in
tra mem- nobis secundum naturā est spiritus: † cōfert
branas aut ne huiusmodi spiritus * efflet, etiā dē-
[quæ mu fitas corporum. Quare huiusmodi affectus
sculos cō- curatio, cōmunem habebit intentionem ad
plectun- laxanda ea quæ astricta sunt corpora, atq;
tur] sicuti ad crassos spiritus extenuandos. Nam si cū
et intra subtiliori substantia sufficienter calefeca-
mēbrano- ris, id quidem quod densatum est rarefa-
sos tendo- cies, quod verò crassius est effectum exte-
nes. nuabis. Patientiū autem particularū natu-

[ibi autē ra, conuenientē auxiliorum materiā coindi-
ita habēt cabit, ac in ipsa maioris minorisque ratio-
antiqui. s. nem. Nam spiritus iste crassus & vaporosus
quæ mu- nonnunquam * sub membranis quæ integūt
sculos aut ossa comprehenditur: nonnunquā verò sub
tendones peritonæo: aliquādo intra intestina vel vē-
complectū trē * comprehenditur verò aliquando à tē-
tur. donibus membranosis, quæ musculos com-
plectuntur. Cōprehenditur etiā ab his quæ
ratione

rōne cognoscunt spatii in musculis, atque
 aliis partib⁹ corporis, quorū locorū naturā
 in tractatib⁹ de sectionibus didicisti. Ita igitur
 ipse musculus inflatur, atq; in vētris vel
 intestinorum corpore flatuosus includitur
 spiritus, & quū sufficiēter frigidus fuerit,
 tunc maximum dolorē excitat. Communis
 autem curatio omnibus est (quēadmodum
 diximus) per subtiliorem substantiam. Et
 quando passio dolorem habet adiunctum,
 talem habentem naturā, vt dolorem talem **ῥοῦλον*
 queat mitigare: secundum patientiū partiū *τῆς θέρμης*
 differentiā* substantia cōmutatur, & inten *πείρας.*
 ditur atque obtunditur vis. Quum igitur *i. materia*
 ex tali spiritu dolor interuenerit in ventre *etiā cura-*
 inferiore, subtile oleum per ima, cum me- *tionis.*
 dicamentis quæ in ipso ebullierint, per cly- *† Id autē*
 sterē iniiciens, statim dolorē sedabis. Quæ *est sison*
 verò debent ebullire in oleo medicamenta *apud Dios.*
 cum partium subtilitate calefacientia, sint *li. 3. & si-*
 cymini, & id quod apud nos est, ac potius non *apud*
 id quod æthiopicum nominatur, & apij & Pau. *li. 7.*
 petroselini semen, & marathri, & *† sinonis, statim post*
 anetique, atque libystici, & seseleos, & dau *ca. de sil-*
 ci, & spondilij: & si coniectura comprehen- *phio et si*
 deris frigidam esse dolentium partiū dispo *in Gra. in*
 sitionem, rutam & marathrū & grana lau- *pres. ea*
 ri intus decoques, miscebisque asphaltum, *pars desi-*
 ipsumque oleum laurinum, & si qua sunt *deratur.*

quæ eodem modo calefaciant. Quod si inflammationem huiusmodi doloribus adiunctam putaueris, auferes ea quæ admodum acria sunt, & quæ vehementius calefacient. Ad ea autem quæ in hoc mediocrem naturam gerunt transibis quæ vini laxandi habent. In oleo itaque concoques anethum non rutam: quibus etiam admiscebis adipem anserinum vel gallinaceum. Sed hæc quidem ubi vehementiores dolores infestant. Mediocres verò etiam extrinseca concalfactione iuuantur, ea præcipuè quæ ex miliis fit. Nam eorum leuitas dolentibus omnino sine molestia est. Si hæc non affuerint, vel ex sale calefacto, vel ex lini semine crudo, vel quocunque alio modo. Cucurbita etiam magna, cum multa flamma, absque cutis scarificatione, sæpius statim dolorem amouit: oportet autem eam umbilicum comprehendere. Quod si etiam tum dolores permanserint, medicamentis ex opio uti non dubitabis, quale est Philonis Tarsensis omnibus medicis notum. Tamen si scieris aliquam noxam ex huiusmodi medicamentis membris patientibus necessariò affuturam: nihilominus ad id quod magis urget instandum, & parua cum noxa hominem ex nimio dolore animo deficientem liberandum. Nam & sequentibus deinceps diebus

noxam

¶ In im-
pres. est
ωμολι-
γωρ. in
anti. autē
hæc vox
non habe-
tur.

noxam membro contractam, emendare licebit. Vocantur igitur huiusmodi medicamenta, anodyna, quoniam dolorem quidem sedant, & dolorem auferunt: non tamen dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt. Vti autem oportet Philonis medicamento omnibusq; ex opio confectis, non statim, sed post tempus compositionis annum, aut omnino semestrem. Maximè verò atque citissimè ex potu horum medicamentorum laborantes priuantur dolore, vbi intestina gracilia patiuntur, sicuti ex his quæ sedi imponuntur, crassorum intestinorum passiones præsentaneum habent remedium. Non modica autem sit virtutis distributio, † & † In Grec. ex ebibitis, quum superiora afficiuntur: cod. imp̃s. ex his quæ sedi imponuntur, quum inferiora fuerint affecta. Quæ quidem in ita habecarnosis sit partibus spiritus flatuosi agitur κακ- gregatio, nonnunquam omnino vacat τερπινε- dolore, ac longiori tempore durat: ac tum μίαν præcipuè quum fuerint articulationi vicina: hic enim sunt musculi nervosiores τοῖς. ac densiores & carnosiores & rariores in media sui parte. Tales verò (vt nostri) passiones sanari medicamentis ex pice, resina, terebentina, & adipe leonino, atque

καὶ τὸ πε- taurino. Conuenit autem ipsis & quod ex
 πονθόσι, sorde balnei & calce fit, & ex sycomoro, &
 κακτῶν (vt summam dicā) ea quæ insigniter sub-
 εντιθεμι- tili constant substantia, quibus ea quæ mol-
 υων τῇ liendi vim habent admiscuntur.

ἐδρα τοῖς

De abscessibus.

καὶ ἀνὰ

CAP. VI.

καὶ χροῖν. **Q**uoniam de his satis diximus, iā tem-
 id est & pus est vt transeamus ad abscessuū
 ex ebibitis tractationem. Sic autem nomināt eas dispo-
 quū infe- sitiones in quibus à se inuicem distant quæ
 riores par prius se contingebant corpora. Spatiū igitur
 aff. ciū tur vacuū in medio fieri oportet, quod ali-
 tur, & ex quam substantiam spirituosam, aut humi-
 his q̄ sedi dam, aut mixtam ex vtrisque cōprehendat.
 ἵποννται Transeunt autem in abscessum inflāmatio-
 quū supio nes quædam, atque erysipelatosæ phlegmo-
 res fuerit nes ac erysipelata phlegmonosa non pauca.
 affecta. Sine his verò, etiam abscessuum dispositio
 [Hoc est consistit ex multitudine quorundam hu-
 in Græ. morum, aut spirituum vaporosorum: siue
 impres. in in ipsis patientibus partibus [in medio] ge-
 ant. non nerentur, aut ex aliis confluant, ea ratione
 habetur. qua sunt illa quæ apocemmata vocantur.
 Nominant verò sic huiusmodi dispositio-
 nes, quum qui prius vnum membrū infesta-
 bant humores, eo relicto ad alterū trāsmu-
 tantur. Quocunque verò modo fiat absces-
 sus, id spatiū quod abscedentes interiacet
 partes

partes humiditatibus quæ ipsum faciunt cō-
pletur. Quæ ubi aliquando perdurauerint,
varias habent alterationes. Nam & lapidi-
bus, & arenis, & testis, & lignis atque car-
bonib⁹, & limo, & sordicie balnei, & amur-
cæ, & feci, & multis aliis talibus similia in
abscessibus corpora, sæpe contineri inue-
niuntur. Quæ igitur per summa sub cute
consistunt, facile dignosci possunt: neq; est
eorū sanatio difficilis. Nam ex tactus pro-
prietate facillimè discernuntur. Curant verò
ex extrinsec⁹ adhibitis medicamētis neque
medicamētis intro assumptis indigēt, velu-
ti q̄ in pfundo & psertim in viscerib⁹ fiūt.
Porro in dignotionibus, quum suppuran-
tur, † si non adeo manifestè quemadmodū † Legendū
inflammationes digitis incumbentibus reni- est si cedūt
tuntur, dignotionem igitur præbent mani- digitis p-
festam. Ac proprietas cefsionis, alia est in mentibus
tenuibus humoribus, alia in crassis: quæ ad nō resistē-
modum & in tenacibus, atque muccis simi- tia quæ ad
libus. Sæpius verò nobis subiicitur cum ten modū mē-
tione spirituosa pars aliqua abscedēs, * quæ bra inflā-
ubi secta fuerit, inuenitur sanguis concre- mata.
tus: adeo ut qui bis aut ter huiusmodi repe * ibi rē
rit dispositionem: si solers & memor fuerit, θlv70g.
comprehensum in huiusmodi tumoribus
sanguinem ita concretum agnoscere pote-
rit, quum in memoriam ex collatione re-

sit autem aquæ ad oleū multiplex propor-
 tio. Plus autem & hoc suppurationem pro-
 hibet hordeacea farina, simili modo præpa-
 rata. Quæ verò in tali curatione infundi-
 tur aqua, habeat altheæ radices intus deco-
 ctas. Si verò per summa cutis in parte inflā-
 mata tensio valida fuerit, multis scarifica-
 tionibus in superficie† incidere oportet, ac †οχδ&ξρ.
 postmodū ex farina hordeacea elixata, vt i. scarifica
 diximus, cataplasma apponere. Tētaui au- re, vide
 tē sæpius* plurimas, in superficie scarifica- quæ anno
 tiones, cōtrario autem ipsis modo per pro- tauimus
 fundum alias magnas, & tertias item quæ supra in
 medium tenebant in longitudine ac pro- ca. 2. pag.
 funditate inter has dictas. Quæ igitur in 47.
 superficie fiebant, debile auxilium affere *Ita legi.
 bant, quæ verò longæ erant atque profun in ant. ha
 dæ, plurimum quidem sanguinis exhau. bet enina
 riebant adeo vt ferè animi defectum af- π&νυπολ
 ferent. Rursus verò ipsæ propriam cura- λ&ρ in im
 tionem, veluti vulnera exigebant. Quæ pressis an
 autem earum ambarum medium tene. tē est π&-
 bant, semper inueni à prædictis incon- υλ&π&ρ
 uenientibus esse remotas: atque ideo id est val
 eas in vsu censui aliis esse præferendas. de tenues.
 In quibus igitur difficulter ad suppuratio-
 nem peruenit, neque facile discuti tumor
 potest, ibi humores esse compactos crassio-
 res ac tenaciores est existimandum. In his
 vero

verò dispositionibus tantum, conuenit ea quæ fit per profundiores scarificationes curatio. Conuenit etiam id quod ex caricis constat decoctis cataplasma, oportet autem non ipsas assumere caricas, sed aquam in qua ebullientes sunt liquefactæ. Expediit verò & caricas pingues esse & dulces, ut earum humor non dissimilis melli videatur. Et si eas assumens decoxeris usque ad plurimum temporis reddetur aqua melli tenui substantia simillima. Huic igitur aquæ aliquando hordeaceam farinam iniicere oportet, aliquando panem syncomistum. Sic autem nominant eum qui medius inter exquisitæ purum & furfuraceum. Vocant autem nonnulli eundem panem autopyron, quoniam in puro farinam non qualis natura est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes furfur excernunt, contra autem in furfuraceo, prius adimunt eam farinæ partem quæ purissima est. Panis autem qui autopyros appellatur, qualem habet ex natura farinam triticum, talem etiam seruat. Oportet autem triticum ipsum ex quo farina sumitur, esse ex his quæ generosa dicuntur. Quædam enim ex ipsis triticis multum in seipsis furfuris continent, quæ ignobilia dicunt, quædam verò siliginem: quæ
ut

ut dixi, generosa vocant. Nequaquam igitur oportet furfuraceum esse frumentum, ex quo utilem ad cataplasmata farinam accipimus, sed quemadmodum dictum est, multam habere filiginem. Quod si ignobile triticum assumpseris, crassior rem furfuris partē oportet excernere, atque ita panem medium conficere. Ex hoc igitur pane, partem mediam ac teneram ad cataplasmata commiscebis: quando, ut dixi, potentia mediū farinæ hordeaceæ & triticeæ volueris facere cataplasma. Nam farina triticea maximè ad suppurationem mouet, hordeacea verò plurimū resoluit. Hic verò quem diximus panis mediam naturam seruat, sicuti & eius farina, inter nuper dictas farinas triticeas est media. Ad hoc igitur respiciens, cum decoctione caricarum, misce quod tibi conuenientius videbitur, siue ex panibus, siue ex farinis. Si verò tumor resoluatur, minus tamē quā oportet, simul coquere oportet cum caricis hyssopum, vel origanum. Si quando verò vehementius tumorem exiccare volueris, sal decoctioni adicias, deinde hoc modo infunde farinam hordeaceam. Eximatur autē & hinc quicquid furfuraceū inest. & postquā plurimum ebullierit, appone cataplasma. In tumoribus quidem qui difficulter

culter resoluuntur, verendum est ne eorum reliquæ scirrosæ relinquantur, quare in singulis solutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis cuius curatio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exiccantibus agitur, reliquias scirrhas operatur. Hoc verò in singulis solutionibus animaduertes, si partem patientem tetigeris, & quod nunc apparet, illi quod prius videbatur contuleris. Si igitur vnquã tale suspicatus fueris, decoque in aqua cucumeris agrestis radicem aut brioniæ, aut asari, sæpius quidem per se solas, nonnunquam caricas pingues adiiciens. Deinde aquæ farinam admisce, cõmiscens & aliquid adipis anserini præcipuè vel gallinacei, quod si nõ affuerint, suillum adiunges. Radices quoque earum quas nuper diximus herbarum, atq; præterea altheæ, si post moderatam decoctionem cum pane atq; adipe conterantur, huiusmodi tumores resoluunt, fortior autem hisce omnibus est dracontij radix, & si quando ea vti volueris, quum sit his quas nuper diximus multo subtilior, atque ad resoluendum potentior, omnino adipem commisce. nisi enim humectaueris atq; mollieris scirrhos, sed cū fortibus medicamentis resolvere tantum studueris, in primis quidem diebus eos insigniter de-
cresce

crefcere facies, fed pariter id quod relinqui-
tur indurabis, hoc verò induratum difficul-
ter refoluetur. Melius igitur, vt diximus,
fortiter refoluentibus medicamentis com-
miscere mollientia, ne tumores in fcirrhus
(quorum curationem in præcedentibus au-
diuifti) conuertantur, verentes.

De tumore fuppurato. CAP. VII.

Rurfus igitur ad fuppuratos tumores
accedamus, quos vbi poffe refoluere
desperaueris, ex farina triticea vttere cata-
plafmatibus. Nã ad celeritatem fuppara-
tionis plurimum conferunt. Deinde ape-
riens, fi videris ea quæ circa fectionem funt,
libera inflammatione, medicamentis quæ
emplaftica dicuntur vttere. Efto autem eo-
rum vis ad exiccandum habilis, careant
etiam morfu, neque astringentia medica-
menta habeant admixta, fed ea potius quæ
fine moleftia folum refoluunt, vel parum
aliquid astringentis habeant facultatis.
Ego verò fapius in huiusmodi, vfus fum
medicamento ex fermento & oftreis com-
bustis confecto, fi verò pars aliqua circa
fectionem inflammata fuerit, id quod ex
chalcite conftat oleo liquefaciens: vbi ve-
rò paulatim refrigerat ū fuerit, in mortario
temperans & molliens manibus, atq; vinū
infundens, vt nofti. Ad multa verò vtilè
eft

est hoc medicamentū, quē admodum in li-
 † Hic gra. bris de cōpositione pharmacorū diximus.
 cod. īpres- Faciemus etiam alios, si deus voluerit, de
 si sunt mē pafsionibus quæ singulis partibus accidūt,
 dosi: ha- vbi omnium medicamentorum quibus vti
 bēt enim consueui, diligenter vires explicare tenta-
 τῇ καλου- bo, atq; eorum vsum opportunum expone-
 μένῃ κατὰ re. Sed tu iam in hisce medicamentis, de qui-
 πλάσμα- bus in hoc libro meminī, habuisti à me an-
 τος ἀγο- tea & mensuras, & præparādi modum, vbi
 γῆν θερ- verò plus opportuno cutis coliquata fuerit
 πύρεθαι in suppuratationibus adeo vt panno lacero si-
 τὸ ἔλκος. milis efficiatur: non facilè subiectis corpo-
 i. per ap- ribus agglutinatur, ita vt necesse sit † eum
 pellatā ca qui sine, cataplasma nominatur curationis
 taplasma modum adhibere.

tis rationē

De sinu.

CAP. VIII.

vlcus cu-

rare. Sed

in codi.

manuscri

ptis quos

vidimus

legitur nō

καταπλά

σματος.

Sed κατὰ

πλάτος.

Quod qui

QUum verò amplius agglutinandi cu-
 tem subiectis corporibus creuerit
 difficultas (huiusmodi affectum sinū appel-
 lant) deinceps tibi in memoriam reuocabo,
 huius quoque curationis modum, quem vi-
 disti me sæpius in pluribus adhibere. Vbi ta-
 lis dispositio consistit, satius est fistulā di-
 rectè perforatam, vel ex ære vel ex cornu
 factam habere paratam, quod si hæc non
 fuerit, vnum ex his instrumētis quæ pyul-
 ca, id est puris attractiua, dicuntur, quod
 foramen latissimum habeat. Et eius quod

anno

a nobis compositum est ex charta combu- *da vertut.*
 sta medicamentum, tu saepe vidisti me exi *Itaq; emis*
 guam portionem multo oleo rosaceo per- *sario lar-*
 miscere, ac per id instrumentum quod pus *giore fa-*
 attrahit in sinus iniicere, deinde linamento *cto vlcus*
 cōcerto os claudere. Quaecunq; verò em- *necessario*
 plastica medicamenta oleo rosaceo liquefa *curadum*
 cientes his iniicimus, pyulcon nō permeāt. *est. De hoc*
 Sed in his oportet vesicam suillam accipiē *vide no-*
 tes, fistulam directum foramen habentem *stras an-*
 apponere. Esse verò acriora medicamenta *notatiōes.*
 liquefacta, quam illa quæ emmota: id est
 quæ linamentis illinuntur, est necessarium,
 qualia sunt apud omnes vsitata, colore vi-
 ridi insignia, hæc enim oportet non pau-
 co oleo rosaceo liquefacere, vt in sinum
 iniici possint, dissoluitur autem emmoto-
 rum vis in huiusmodi mixtionibus. Igitur
 emplastica omnino medicamēta, quale est
 Macharionis, & Epigoni, & quod Isis co-
 gnominatur, vbi ad emmotorum vsum de-
 ducuntur, cerati indigent admixtione, nem-
 pe hæc ad sinus vtilia sunt, qua enim ratio-
 ne eis ceratum admiscetur, eadem etiam
 sunt ad sinus vtilia. Miscentur autem, quo-
 niam vires mordaces habent, si per se so-
 la liquefcerent, non admixto ipsis cera-
 to. Sed vbi quidem oleum rosaceum plu-
 rimum fuerit, quod in ipso liquefcit me-

H

dicamentum paucum, non amplius acritudinem seruat. Vbi verò sinus mediocriter carne oppletus fuerit, tunc agglutinantia medicamenta apponere oportet, veluti si recenti & sanguinolento vulnere medicare ris. Multa verò tali sunt natura prædita, quæ partim ex asphalto constant, vocant autem huiusmodi nescio quo modo emplastra barbara. Alia verò sunt quæ *†* cirrhotæ ex colore dicuntur, ex lithargyrio & æruginæ æris decocta plurimum, sic enim ærugo cirrhum colorem accipit. Si verò paucum ebulliat, facit emplastra quæ lutea dicuntur. Te verò non latet quod omnia metallica medicamenta subtiliorum partium sunt, atque exiccandi vim maiorem habent, ubi plusculum ebullierint. His verò medicamentis simul atque ruffa sunt repositis, quædam extrinsecus supereminencia fusca concresecit, sub qua pars medicamenti profundior, plusquam ab initio ruffor videtur. Atque idcirco nonnulli huiusmodi emplastra vocant bicolora, quidam verò bifacia. Quanto verò subtiliora fuerint, ac maiorem exiccandi vim habuerint, tanto plus in sinum operabuntur. Nā ad eius profundum oportet transmitti vim, si intentionem propositam assequi velimus. Quæ verò recentia & sanguinea vulnera agglutinant,

† In gra. est κίρρα. ἢ φαιά. i. flava vel fusca.

tinant, quanquam his minus exiccant, labra vulnerum, si brevia extiterint ac minimè profunda, agglutinant, atque ob hoc facile ac citò quod oportet efficiunt. Si verò in profundum vulnus recens protendatur, & futuris & fibulis solemus ipsa coniungere. Sinus itaque omnes non simplices sunt diuisiones, sed frequenter in ipsis, modò vna pars, modò alia excoriata est, quod neque te oportet latere. Quum igitur ad locum superiorem sinus extenditur, facile per os humor vitiatuſ elabitur. Si verò vergit ad ima, quum intus retineatur, partem aliquam continuam erodit. In his quidem sinibus, nisi prius ad effluxum feceris sectionem, nihil proficies: neq; quum carnem generare, neque quum agglutinare volueris. In aliis verò non opus est sectione, si modo conuenientem figuram in parte patiente seruaueris, ex qua figura potes aliquando sinum ad partem superiorem vergentem facere ad inferiorem declinare: ac contra, vergentem ad ima, conuertere ad superiora. Vidisti me igitur sinum in brachio existentem, cuius os erat prope cubitum figura in superiora tédente, sanasse sine alia facta ex aduerso sectione: & in coxa similiter figura sinus ad ima vergente, quum sinus versus genu quidè terminaret, altius

verò os media coxæ regione superius, si-
ne vlla ex aduerso diuisione similiter vi-
disti factam esse curationem, subiiciente
me popliti cervical molle, vt inferiorem
situm haberet inguen quam genu. Suffe-
cit autem in hoc sinu, & aliis isto maiori-
bus, solum mellicratum immissum, aptum
ad conglutinandū omnes eius partes pro-
fundiores. Quidam autem lixiuium per-
colatum iniecerunt, seipfos coarguentes
in his, quæ prius ad carnem sinui inducen-
dam medicamēta apposuerunt, neque enim
caro noua adnasci potest, quum sordicies
priorem circumsedit. Quomodo igitur
sufficiens carne innata sinui congluti-
natiuum adhibent medicamentum? siqui-
dem veluti satis sordidum existentem li-
xiui abstergere tentant, quum pura caro
neque acrius mellicratum toleret. In

† *ixōπερς* hoc igitur satis est, si hoc tale immitta-
id est sa- tur, quale quispiam cum voluptate pota-
niem. ret: & post mellicratum solitus sum de-

* In *græ.* incept, antequam medicamentum con-
legitur, in glutinatum imponam, aliquando vino
ter dulce solo, aliquando vino mulso sinum ablue-
e auste- re. Nam ad abstergendum atque ad
rū mediū expurgandum † circumstantes humores vi-
locū obli- tiatos mellicratū est melius, sed ad cōgluti-
neat. nandum, vinum est melius & efficacius: * sit

autem

* In ant. est non μόνος, sed ἢ οἷνός, id est, vel ex vino.

† μαλακός ὡς σφύμαλινος, id est mollis quam maximè licet.

* In græco ita legitur, linteorum verò circumuolutiones constringantur quidem in fundo sinus, sed non ita ut dolorem inferant, paulatim autem laxentur vsque ad os sinus.

* In cod.

autem quod habeat dulcedinem & vim impres. le-
astringendi mediocrem. Et quidem post gitur in i-
medicamenti agglutinantis appositionem δοσις, id
spongia noua ex mulso * sola circumuoluta est, addi-
tur † quam molliter fieri potest, atque al- tamentū,
ligatio quidem incipiat à fundo sinus, si in anti-
niat, autem ad os, * sed nec linteorum cir- quo verò
cumuolutiones ad fundum sinus dolore af- in δόσις,
ficient, sed cōstringantur paulatim atque & ita
soluantur vsque ad os sinus, & hoc ipsum vertit in-
habeat laxam pharmaci * alligationem, & terpres,
quod circum apponitur emplastro ita cum & in a-
forficibus discisso ut ex ore sinus humores lio anti-
vitiati † si qui excernantur, possint efflue- est in i-
re, paruo aliquo alio ipsi imposito empla- δοσις, id
stro vsque ad solutionem, quam tertia die est apposi-
faciens, auferes hoc ipsum, quod veluti tionem.

† Ita ha-
bent Græ-

ti cod. antiqui quos sequitur interpres, Aldinum autem
esse mendosum hoc in loco, indicat etiam editio Blasti, in
qua legitur sicuti in antiquis.

suprapositum circumiacet, id quod per totum sinum circumiectum est medicamentum relinquens. Indicium autem tibi sit, nunquid pars sinus profunda sit bene cōglutinata, humor emanans si multus, aut paucus, decoctus, aut crudus. Adhuc autem si neque in ipso sinu dolor sentiatur, neque tumor appareat, sed totus locus depressus siccus atque expers doloris existat: si autē
 † In im- & pus† impactum in ore videris paucū, ad-
 pres. est † huc magis bona tibi sit spes de sinus con-
 πειρον. glutinatione, imponensque rursus spongiā
 †. bene co- ac denuò alligans vt diximus, secunda die
 Etum. in vel tertia solue, permutās semper quod ori
 ant. †. πρὸ sinus superstat linteum eodem emplastro
 πρὸ perunctum, quod totum os in circuitu com-
 prehendet. Oportet autem non esse admo-
 dum compressum, sed ita vt omnis humor
 vitiatu ex sinu per ipsum possit euacuari.
 in prima igitur & secunda die si aliquis hu-
 mor tenuis à sinu excernitur, noli omnino
 de cōglutinatione desperare. Sæpius enim
 circumpositi membro patienti vis medica-
 menti vehementer exprimit ex ipsa cute &
 carne subiecta tenuem humiditatem, quan-
 do ita affectum fuerit corpus aegroti, aut
 ex naturali temperatura, aut ex malo victu,
 qua humiditate expressa, spatia mediocri-
 ter

ter exiccata conglutinantur. In tertio au-
tem & quarto ab initio die si humor cru-
dus in ore se ostenderit, tunc scito sinum
non esse conglutinatum. Sit autem præ o-
mnibus id quod patienti membro circumfi-
citur medicamentum, vehementer quidem
exiccans, neque mordens verò, neque in-
tendens, veluti est nostrum quod cirrhum
vocatur, sine cera confectum ex metallicis
medicamentis elixatis & oleo cicino & ace-
ro, quod vulnera sanguinolenta congluti-
nat ac sine molestia sinus exiccat. Vidisti
verò & ipso sanatam fistulam aliquando in
quibus angusto† existente foramine, quum † *In ant. le*
nondum intus callum haberent, sed sordi- *gitur. &*
ciem solum, immisi primum lixiuium, dein *μα καὶ μα*
de tandiu intus permanere permisi, donec *κράς. i. si-*
speraui totam sordiciem penitus excidis- *mul & lō*
se: post modum medicamentum apposui. *go.*
Si verò & eos qui sub cute sunt sola sinus,
in quibus nondum carnem generari opor-
teat, quique ruditer à quibusdam cura-
ti erant, † facta simul susceptione hoc † *In gra.*
medicamento conglutinaui, quum tamen est *ἀμα-*
prius lixiuiο abluissem. Quoniam qui vl- *τῶ παρα*
cera curant, nullum ex his, quæ expurgan- *λαβῆν. i.*
di vim habent, adhibent medicamentum. *simul atq;*
Vbi verò qui ad abscessum perueniunt, tu- *suscepi.*
mores tardè secti fuerint, aut ob medicatiū

imperitiam, aut eorum quibus medela adhi-
 betur timiditatē, qui secari non patiuntur,
 sed expectant vt longiori tempore cutis à
 pure rodatur: contingit sæpius vniuersam
 cutim à pure circa abscessum aggregato
 sufficienter extenuari instar laceræ vestis,
 unde & illi nomen* lacerosi à medicis indi-
 tum puto. Est itaque huiusmodi cutis con-
 glutinari contumax, præcipuè si quis secun-
 dum substantiam siccum medicamentū im-
 ponat, ex his enim magis fit laceræ vesti si-
 milis, & sicca cutis instar pellium detrita-
 rum. Visum est igitur mihi opportunum, si
 quis ad eius conglutinationem vtatur me-
 dicamento, substantia quidem humido, po-
 tentia autem sicco. Dictum autem in libris
 de medicamentis quod potentia sicca me-
 dicamenta dici solent à medicis quæ exic-
 candi vim habent. Optimum autem ex o-
 mnibus medicamentis quæ substantiā qui-
 dem humidam habent, vim autem exiccand-
 i, est id quod à me compositum est ex li-
 thargyriō & adipe suillo antiquo & chal-
 cite, quibus additum sit oleum vetustissi-
 mum. Nam vim eius esse efficaciorē suam
 expertus ad huiusmodi dispositiones, quā
 neque admodum durum fuerit, neque ex-
 quisitè non inficiens. sed si tale cōficiatur
 & vulnerum sanguine manantium conglu-
 ti

φναθζ

περ τερα

κος.

*ρακώδες

ταμδλυν-

70p. est in

græco.

tinatium erit, & omnia etiam vlcera ad cicatricem perducit, si & oleo remittatur, & cum vino mediocris ætatis commisceatur, deinde in circuitu eiusmodi dispositionibus apponatur, ipsas sæpius sine vlla molestia conglutinavit. Confert autem, vt diximus, in lacerosis cutibus non minus mel, si vsque ad emplastri consistentiam elixetur. Eius verò elixationis mediocritas vix rectè perficitur, nisi inspiciatur: oportet enim ipsum neque adeo esse durum vt difficile ter lambatur, neque ita humidum vt circumfluat. Nam quod durum est, ad eandem peruenit cum duris emplastris absurditatem: humidum verò veluti superiectum calido corpori vndique circumfluit, & siccum lin-teum derelinquit, quod non modò nihil iuuat, sed etiam nonnunquam obest cuti, quæ debet cōglutinari. At si mediocriter elixatur, hoc quidem optimum est medicamentum in huiusmodi sinibus, sed quoniam elixationis eius mediocritas non facile potest coniectura attingi, rectius mihi visum est ei myrrham * subtiliter tritam aspergere, aut aloë vel thus, aut aliquod ex his, vel omnia simul, tum præcipuè quū linteo inunctum humidius apparet. Oportet autem aspergere ista per cribrum quod sublimè * supra mel tepeatur. sufficit autem semel aut

H s

bis agitare, vt mediocriter excidat. Sæpius
 verò & dum elixatur adiicio melli aliquid
 ex antedictis medicamentis, quando præ-
 fertim sinus maior fuerit atque profundior
 Vfus sum aliquando & tenui centaureo,
 quod mirum est ad huiusmodi medicamen-
 tum. Post ipsum verò & symphytum vtile
 est, & deinde ireos illyricæ radix, postea fa-
 rina ex orobis: neque obscurum est quin &
 contundi oporteat, & per cribrum subtile
 † *λελξω* transmitti, ac postmodum † *resolui* talia o-
mnia. melli autem commisceantur eo tem-
 pore quando debet ab igne amoueri, tan-
 tum nobis super terētibus donec melli de-
 cocto optimè vniantur. Melius autem fue-
 rit si cacabum ab igne amouentes hæc omni
 admisceantur, & deinde diligenter agite-
 mus, donec mel adeo tepidum reddatur, vt
 corpori cui curatio adhibeatur, possit im-
 poni.

De gangrena.

Cap. IX.

Consequens est vt deinceps dicamus
 de inflammationibus, quæ gangrænæ
 factæ sunt. Nominant autem (vt nosti) gan-
 grænas eas, quæ ex magnitudine inflamma-
 tionis fiunt mortificationes, quæ nondū ta-
 men integræ factæ sunt. Nam quum omnino
 membrum effectū est emortuū vt punctū,
 vel

vel sectum vel adustum non sentiat, quæ patitur, statim recidere oportet, qua sanam partem vicinam attingit: sed quod ita affectum est denigratur: quod verò in medio est constitutum, vt tendat ita ad mortem gangræna nominatur. Curatur autem euacuantibus nobis quam possumus multum sanguinis, qui in membro patiente compingitur, cuius causa fiunt mortificationes, ob id quod arteriæ ex angustia loci nequeunt se attollere, reliquo autem transpirationes, exhibentibus. Aut igitur cutem vniuersam multis sectionibus profundis secare oportet vna cum subiecta substantia, aut plurimis scarificationibus profundis incidere, sanguinem verò quum manare permiseris, imponere debes ex medicamentis aliquod ad putrescentia vtilibus, cuiusmodi est † farina orobi vel lolij. Si verò ^{† In gra.} talia non ad sint, fabarum farinam adhibe, ^{additur} atque ipsum oxymel solum: & si fortius ^{δι οξύμ.} medicamen apponere velis, adice sal, aut ^{λιτος κος} extrochiscis aliquem exquisitissimè tritū, ^{.i. ex oxy-} qualis Andronis & Polyidæ, & Pasionis ^{melite, &} est, & Musæ medicamen ad hæc aptissimum, quod in Heræ tomo scriptum est. Vtor, autem ex his quæ antea diximus, animum aduertens ad corpus ægroti: nam si rusticum fuerit & durum natura, fortissima

me

medicamenta desiderat, foemineum verò
 & molles carnes habens, imbecilliora: sic &
 viri quicunque & molles carnes habent, &
 balneas amant, & in otio degūt, mollia exi-
 gunt medicamenta. Neque dubium est idē
 in pueris faciendum esse. Et si quando etiā
 putrefactam atque emortuam partem absci-
 deris, vt securius agas, his vttere medica-
 mentis, naturam corporum simul attendēs,
 atque eius insuper partis quæ malè affecta
 est. Quædam enim sunt, quæ citissimè ad
 putredinem veniunt, & fatius est ob maio-
 rem securitatem, quando abscindis aut cir-
 cūcidis id quod iam putruit, eam quæ velu-
 ti quædam radix est, sanæ parti adiunctam
 adurere, sicuti sapius in pudendis facere cō-
 sueuimus, nonnunquam malè affectis par-
 tibus, quæ adurunt afferentes. quandoque
 verò linamentum ante submittens: facta
 verò adustione solemus (vt nosti) vt i succo
 porri, qui vbi non adsit, his quæ paulò an-
 tē diximus. * Vbi verò tibi videbitur his
 remediis adhibitis cessare putredo, vt citò
 frustra excidat medicamento quod nomi-
 natur Cephalicum cum melle vttere. Me-
 lius verò & ex hydreleo pane decocto,
 vel farina hordeacea, vel etiam triticea fa-
 cere cataplasma: id etiam medicamentum
 quod Tetrapharmacum nominatur, ac pre-
 terea

Malè le-
gitur in
græ. impf.
μὴ ὀν pro
μὴ ὀν.

* In ant.
additur.
πρὸ ξί-
σσοις.

* Legitur
in græ. fa-
rina hor-
deacea eo-
tē diximus.
* Vbi verò
tibi videbitur
his remediis
adhibitis
cessare
putredo, vt
citò frustra
excidat
medicamento
quod nomi-
natur
Cephalicum
cum melle
vttere. Me-
lius verò &
ex hydreleo
pane decocto,
vel farina
hordeacea,
vel etiam
triticea fa-
cere cataplasma:
id etiam
medicamentum
quod
Tetrapharmacum
nominatur,
ac pre-
terea

tereà Macedonicum, sunt crustarum suppu-
 rationibus, atque earum excidentiis accom-
 modatissima. Similiter autem & quæcunq;
 vim habent ad supputationem perducendi,
 & panis verò tritus cū apio vel ocymo opti-
 mē crustas disrumpit, & à sanis partibus se-
 parat. Ex simplicibus autem medicamentis
 iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel
 acori cum melle. In mollibus verò corpo-
 ribus sufficit orobi farina cū melle vel thu-
 re. Aufert autem & crustas Machæionis
 medicamentum, & *iris cum melle. Quum *In impf.
 verò exciderint crustæ, huiusmodi vlcera est h̄ ipsis
 possunt quibuscunque medicamentis, quæ ἐμμοτα.
 carnem inducant, ad sanitatem perducī. quæ lectio
 in Aldino
 notatur
 tanquam

De cancris.

Cap. X.

QUum de his abundè dictum sit, reli- corrupta.
 quum est vt de carcinosis tumori ant. autē
 bus differamus, qui in omnibus quidē par- legitur
 tibus corporis fieri consueuerunt, sed in ma ipsis metā-
 millis præsertim mulierum, quæ à natura μιλίτος.
 purgationem non habent, quæ vbi modum isis cum
 seruauerint, tunc mulier integra fruitur sa- melle. in
 nitate. Hi verò omnes tumores ex atræ bi- alio ant.
 lis superfluitate generantur. de qua dixi- ipsis μιλί-
 mus in commentariis, in quibus de poten- μιλίτος
 tiis naturalibus egimus, vbi ostendimus
 hunc

hunc humorem, dum sanguis in hepate fit, fecis vinariæ proportionē generari, expurgari autem à splene, qui ex eo naturaliter habet alimentum. Quum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum generauerit, & ratio victus adhibita confert, & splen satis attrahit ex eo qui generatur, nulla huiusmodi superfluitas in venis coacer-

† Ita ha- uatur. *†* At quum vel omnia vel aliqua eue-
bent ant. niunt in contrarium, tunc in venis multipli-
cod. in im catur, & eas de quibus dicturi sumus, facit
pres. autē ægritudines. Dico autem his quæ antea ex-
legitur d- posuimus contraria, vt scilicet hepar ad ge-
rup di t' a nerandum huiuscemodi superfluitatem fit
vāvria d aptum. Sit etiam ratio victus per tales adhi-
i. quū ve- bita cibos, qui crassum & feculentum hu-
rō contra- morem procreare natura apti sunt, splen
ria eue- verò sit natura imbecillior, & quicquid de
niunt. ea superfluitate generatur, ad se minimè
** In ant.* trahere potens. In hoc verò * corpore tur-
legitur. bidus fit, ac crassescit is qui in venis conti-
voa hūate netur sanguis, & nonnunquam à venis ha-
d. morbo. bentibus (sicut & alia omnia) vim excernendi id quod extraneum est, per hæmorrhoidas excernitur. Sæpius autem & ad varices decumbit, & quandoque ad cutem vniuersam expellitur, fitque is morbus quem Elephantem nominant: nam & aliquando ad alias corporis partes, quæ cæteris sunt imbe-

imbecilliores, humor iste defertur, atque
 euidenter apparent quæ in illa parte sunt,
 venæ, nigro sanguine ac crasso plenæ, quan-
 toque crassior fuerit ac nigrior, tanto de-
 terior est passio. In mamillis autem sæpe
 vidimus tumorem forma ac figura cancro
 animali consimilem. Nam quemadmodum
 in isto pedes ex vtraque parte sunt corpo-
 ris, ita in hoc morbo venæ distenduntur
 ac figuram omnino similem cancro repræ-
 sentant. hunc morbum per sui initia sæpe
 sanauimus. Sed vbi in molem insignem sa-
 tis attollitur, nemo sine manus opere po-
 tuit curare. Itaque in omni huius generis
 curatione intentio est, totum qui circun-
 stat tumorem præter naturam, qua parti-
 bus sanis adhæret abscindere, sed ob va-
 forum magnitudinē, quū præsertim fuerint
 arteriæ, profluuij sanguinis statim periculū
 imminet: quod si laqueis eas circūprehēdas
 & passiones insequuntur: si autē & morbi ra-
 dices exurere statuas, neq; huic rei maximū
 periculum deest, quū prope loca mortalia
 fit insignis adustio. Hunc igitur morbum
 (vt diximus) in principio sæpe sanauimus,
 & tūc præsertim quū atræ bilis humor ad-
 modum crassius videbatur existere. Nā sic † In gra.
 purgātibus medicamētis, ex quibus sanitas est † τοσ.α.
 sequi hic.

sequitur, promptè succumbit, neque obscu-
rum est huiusmodi medicamēta debere ef-
se euacuandæ atræ bili accōmodata. Quod
tandiu faciendum est, donec sanitas pristi-
na subsequatur, & ratio victus optimos ge-
nerans humores, interim adhibeatur. In
Alexandria quidem elephantis morbo plu-
rimi corripuntur propter victus modum &
regionis feruorem. At in Germania & My-
sia rarissima hæc passio videtur, & apud
Scythas lactis potatores nunquam ferè ap-
paruit. In Alexandria verò plurimum gene-
ratur ex victus ratione. Comedunt enim
†ἀβάρων. †farinam elixatam & lentem, & cochleas,
& plura salita, & nonnulli ex ipsis carnes asi-
ninas, & alia quædam quæ crassum & atræ
bilis humorem generāt. Nam quum circun-
stans aër calidus sit, motus humorum agi-
tur versus cutem. Huic igitur morbo, quas
antea diximus cōferūt purgationes. Quod
si & ætas & virtus permiserint, sanguis
prius mittendus est. In cancris verò nō in-
utile est, neque in istis vbi nihil prohibet
sanguinem mittere, demum purgare: & si
fuerint mulieres, menstrua euocare, si qui-
dem nondum quinquagesimum annum at-
tigerint. Patienti autem particulæ succus
solani imponatur, nam hoc medicamen ad
huiusmodi vtile est. Quod si nolit agros-
tans

tans medicamento adeo humido illiniri, quum præsertim domo exit ad consueta negocia peragenda, medicamen ex pompholyge constans est imponendum, quo me vidisti uti ad caneros exulceratos: & si hoc non ad sit, adhibe alterum medicamentum nostrum quod ex chalcite fit. In victus vero ratione succus ptisanæ abundanter exhibendus, & serum lactis, & ex oleribus, malua, atriplex & bletū, & quādo tēpus tulerit cucurbitis ut edū, & piscibus petrosis, & avibus omnibus, exceptis palustribus.

De Elephantia.

CAP. XI.

Sed his qui elephantiam patiuntur, in viperarum esu est mirabile & auxilium. † Βοήθεια. Ita vero eas condire oportet quemadmodum vidisti Marfos qui feris venenatis & anti. in aspidibus nutriuntur: capite quidem pri. impres. mum abscisso, & cauda, usque ad digitos φάρμα. quatuor: deinde omnibus interaneis exem. κορ. ptis, cute etiam † ut liquere potest ad em. † διλονδ. pta, aqua deinde abluatur corpus ipsarum. τι. i. vide. Sed neque aliter quum theriacum antido. licet. tum conficere volumus, usque ad hoc præparamus: sed deinceps concoquimus differenter, in theriaca autē paululum anethi & paucum salis in aqua ponentes. In his autem qui elephantia si laborant, in olla anguillarum modo præparantes, & album

I

ius efficientes, fit autem hoc modo. Aqua abundanter in ollam funditur paucū olei & cum hoc porrum & anethum adiicitur, liquet autem quod viperarū carnes sunt decoquendæ, donec exquisitè molles reddantur. Ipsum etiam medicamentū confectum ex viperis quod theriacam appellant, optimum est ac potandum iis qui huiusmodi morbo laborant, vel etiam si cui libuerit ad cutem oblinendam: nam quum omnia hæc facta fuerint, nonnunquam solet squama à cute decidere, aut quid simile ei, quod senium serpētis appellatur. In aliis autem tumoribus præter naturam non putavi oportere eam quæ manu fit curam hoc in loco scribendam, quum tu medicamenta proba-

† *ἡ δὲ κατὰ τὴν ἰατρικὴν ὁδὸν* tiffima à nobis acceperis. In strumis enim ea quæ astringere & exiccare, & pus etiam *ἐκ τῆς ἰατρικῆς* facere possunt, in his autem quæ meliceriquæadmodos dicuntur, ea quæ has dissoluendi vim *ἔχουσιν* habent, & quæ pus resolvunt medicamēta, & aquam quæ in scroto & abdomine detercutem cubuit, accepisti, † quibus etiam in aqua inlaborantibus utaris. In his enim duplex intentio est, scilicet ut sanetur tumor *[Hæc in durus in viscere, & coaceruata humiditas græ. codi- dissoluatur. At prius dictū est de curatio-* ne viscerum scirrho laborantium: [sed differtur. ferunt quum talem tumorem partes patiuntur.

tur, & differentem exigunt curam.] Quare curatio hydropum ad has tres reducitur intentiones, vt sanemus durum tumorem qui in viscere est, vt ea apponamus quæ humiditatem dissoluunt, & medicamēta quæ vrinam mouent in potu demus. Hæc quidam ad te missa qui longè peregrinaturus eras, mediocriter se habere visa sunt. Si verò (vt institui) librum de medicamētis secundum morbos & loca patientia composuero, illum in tuo reditu habebis. Sed & aliud opus magnum amicis ex postulatibus exarabitur, in quo tota ars curandi continetur, etiam si tibi peregrè detineri diutius contigerit, singulos qui a nobis scribentur commentarios ad te mittere non grauabimur.

*

Quæ in fine huius libri de curatione podagrici affectus in veterem translationem irrepsérant: quoniam nō Galeni, sed Alexandri Tralliani esse nouimus, consulto omisimus, in alijs autem locis multa quæ Galeni esse censemus, & in Græcis codicibus desiderantur, ex veteri ipsa versione, vt licuit, restituumus.

I 2

